

レジメンマスタシート

1 / 3

発行日時 2024年11月21日 17時50分

レジメンNo. 007128 診療科 産科婦人科 有効期間 2016/06/09~2099/12/31
レジメン名称 PLD (30mg/m2, d1)+CBDCA (d1)+BEV (10mg/kg, d1, 15) (・適用日数 28日 最大回数 99回)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)	day (15)						
01	点滴 点滴注射 (速度指示) 主管より 90 分で ※CSTD74*フタ 5 %大塚糖液 (250ml) 1本	166.67ml/h	09:30							
02	点滴 点滴注射 (速度指示) 側管より 15 分で デキスト注射液 (6.6 mg/2ml) (エステル 8 mg) 【AD】 グラニセトロン点滴静注 パック (3mg/50mL) 「HK」 1袋	200ml/h 6.6mg	10:00							
03	点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤 + 無菌1180 投与中、手首足首クーリング 主管より 輸液ポンプで 【禁】フィルター ☆ドキシル注 (20 mg / 10 ml) 5 %大塚糖液 (250ml) ※血管外漏出に特に注意が必要 30 mg/m2 30mg/m ² 1本 1.5 V	250ml/h	11:00							
04	点滴 点滴注射 (速度指示) 主管より 15 分で 5 %ブドウ糖注 (50 mL) 1本	200ml/h	12:00							
続き有り										

確認コメント AUC5 iPLASのSCr<0.7はSCr=0.7として計算	
注意コメント 【PLD (30mg/m2 d1), CBDCA (AUC=5 d1), B-mab (10mg/kg d1, 15) q28】 AUC=5 ドキシル投与中、手首足首をアイスパックにて冷却 アバスチン点滴速度 初回66ml/h 2回目100ml/h 3回目200ml/h	

レジメン番号 13423

レジメンマスタシート

2 / 3

発行日時 2024年11月21日 17時50分

レジメンNo. 007128 診療科 産科婦人科 有効期間 2016/06/09~2099/12/31
レジメン名称 PLD (30mg/m², d1)+CBDCA (d1)+BEV (10mg/kg, d1, 15) (・適用日数 28日 最大回数 99回)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)	day (15)					
05	点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌1180 Cockcroft-Gaultで計算 主管より 60 分で (毒)カボ' プ' ラチン点滴静注液 NK (450mg/45mL) 5 %大塚糖液 (250ml) AUC=5 CBDCA投与量 最大750mg。	250ml/h 1mg/GFR+25 0.0022 V 1本	12:15						
06	点滴 点滴注射 (速度指示) ルートフラッシュ用 主管より 15 分で 生理食塩液 50 ml	200ml/h 1本	13:15						
07	点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌1180 主管より 30 分で ☆アバスチン点滴静注用 (400mg/16ml) 大塚生食注 (100ml) 10 mg/kg	200ml/h 10mg/kg 0.025 V 1本	13:30						
08	点滴 点滴注射 (速度指示) アバスチン投与後ルートフラッシュ用 主管より 15 分で 生理食塩液 50 ml	200ml/h 1本	14:00						
09	点滴 点滴注射 (速度指示) 主管より 15 分で ※CSTD7タ' プ' タ 生理食塩液 50 ml	200ml/h 1本		10:15					
続き有り									

確認コメント

AUC5 iPLASのSCr<0.7はSCr=0.7として計算

注意コメント

【PLD (30mg/m² d1), CBDCA (AUC=5 d1), B-mab (10mg/kg d1, 15) q28】
AUC=5 ドキシル投与中、手首足首をアイスパックにて冷却
アバスチン点滴速度 初回66ml/h 2回目100ml/h 3回目200ml/h

レジメン番号 13423

レジメンマスタシート

3 / 3

発行日時 2024年11月21日 17時50分

レジメンNo. 007128 診療科 産科婦人科 有効期間 2016/06/09~2099/12/31
レジメン名称 PLD(30mg/m², d1)+CBDCA(d1)+BEV(10mg/kg, d1, 15) (・適用日数 28日 最大回数 99回)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（主単位）						
		速度指示	day (1)	day (15)				
10	点滴 点滴注射（速度指示）抗悪性腫瘍剤＋無菌1180 主管より 30 分で ☆アバスチン点滴静注用（400mg/16ml） 大塚生食注（100ml） 10 mg/kg	200ml/h 10mg/kg 1本 0.025 V		10:30				
11	点滴 点滴注射（速度指示） アバスチン投与後ルートフラッシュ用 主管より 15 分で 生理食塩液 5 0 m l	200ml/h 1本		11:00				
終了								

確認コメント AUC5 iPLASのSCr<0.7はSCr=0.7として計算	
注意コメント 【PLD(30mg/m ² d1), CBDCA(AUC=5 d1), B-mab(10mg/kg d1, 15) q28】 AUC=5 ドキシル投与中、手首足首をアイスパックにて冷却 アバスチン点滴速度 初回66ml/h 2回目100ml/h 3回目200ml/h	

レジメン番号 13423