

レジメンマスタシート

1 / 2

発行日時 2024年11月22日 15時18分

レジメンNo. 0570847

診療科 血液・腫瘍内科

有効期間 2020/04/09~2099/12/31

レジメン名称 RCHOP

適用日数 21日 最大回数 10回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位)	速度指示					
			day (1)	day (2)				
01	点滴 ① ※CSTD7タフタ 生理食塩液 50ml ポラミン注(5mg/1ml) ソル・コーテフ注射用(100mg)【AD】	点滴注射(速度指示) 100ml/h 1本 1A 1V	10:00					
02	点滴 ② テルモ生食注(500ml) ☆リツキシマブBS点滴静注(500mg/50mL)) KHK 正式には1mg/mlの濃度に 375 mg/m2	点滴注射(抗悪性腫瘍剤+無菌1180) 1袋 375mg/m ² 0.75 V	10:30					
03	点滴 ③ 生理食塩液 50ml	点滴注射(速度指示) 200ml/h 1本	○					
04	点滴 ① ※CSTD7タフタ プレドニン水溶性注(50mg)【AD】 グラニセトロン点滴静注 ハック(3mg/50mL)「HK」	点滴注射(速度指示) 100ml/h 100mg 1袋		10:00				
05	点滴 全開で投与 ② 生理食塩液 50ml 1.4 mg/m2 ☆オンコビン注(1mg)	点滴注射(抗悪性腫瘍剤+無菌1180) 1本 1.4mg/m ² 1.4 V		10:30				
続き有り								

確認コメント

プレドニン経口 100mg(day3-6) オンコビン最大2mg

注意コメント

【RIT(375mg/m² d1), q21】 HBV感染有無確認
【PSL(100mg/body d2-6), VCR(1.4mg/m² d2), ADM(50mg/m² d2), CPA(750mg/m² d2), q21】
リツキシマブ 投与速度初回: 0分 25mL/h, 60分後 100mL/h, 120分後 200mL/h
リツキシマブ 投与速度2回目以降: 0分 100mL/h, 60分後 200mL/h
プレドニン経口 100mg/日(day3-6) オンコビン 最大投与量 2mg 通常6~8コース施行

レジメン番号 13705

レジメンマスタシート

2 / 2

発行日時 2024年11月22日 15時18分

レジメンNo. 0570847

診療科 血液・腫瘍内科

有効期間 2020/04/09~2099/12/31

レジメン名称 RCHOP

適用日数 21日 最大回数 10回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（主単位） 速度指示	day (1)	day (2)					
06	点滴 点滴注射（抗悪性腫瘍剤＋無菌180） 全開で投与 ③ ☆トキリビシン塩酸塩注射液 50mg/m ² 1V 「サント」(50mg/25mL) 大塚生食注(100ml) 1本 50 mg/m2			10:45					
07	点滴 点滴注射（速度指示）抗悪性腫瘍剤＋無菌180 250ml/h ④ ☆エンドキサン注(500mg) 750mg/m ² 1.5V テルモ生食注(500ml) 1袋 750 mg/m2			11:00					
08	点滴 点滴注射（速度指示） 200ml/h ルートフラッシュ用 ⑤ 生理食塩液50ml 1本			13:00					
終了									

確認コメント

プレドニン経口 100mg(day3-6) オンコビン最大2mg

注意コメント

【RIT(375mg/m2 d1), q21】 HBV感染有無確認
【PSL(100mg/body d2-6), VCR(1.4mg/m2 d2), ADM(50mg/m2 d2), CPA(750mg/m2 d2), q21】
リツキシマブ 投与速度初回：0分 25mL/h, 60分後 100mL/h, 120分後 200mL/h
リツキシマブ 投与速度2回目以降：0分 100mL/h, 60分後 200mL/h
プレドニン経口 100mg/日(day3-6) オンコビン 最大投与量 2mg 通常6～8コース施行

レジメン番号 13705