

レジメンマスタシート

1 / 2

発行日時 2024年11月22日 15時18分

レジメンNo. 0570850 診療科 血液・腫瘍内科

有効期間 2020/04/09~2099/12/31

レジメン名称 R-THPCOP(岐阜大プロトコール 70-79歳)

適用日数 21日 最大回数 25回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)	day(2)						
01	点滴 点滴注射(速度指示) ① ※CSTD7がフタ ボラミン注(5mg/1ml) 1A ソル・コーテフ注射用(100mg)【AD】 1V 生理食塩液50ml 1本	100ml/h	10:00							
02	点滴 点滴注射(抗悪性腫瘍剤+無菌180) ② ☆リツキシマブBS点滴静注(500mg/50mL 375mg/m ² 0.75V) KHK テルモ生食注(500ml) 1袋 正式には1mg/mLの濃度に 375 mg/m ²		10:30							
03	点滴 点滴注射(速度指示) ルートフラッシュ用 ③ 生理食塩液50ml 1本	200ml/h	○							
04	点滴 点滴注射(速度指示) ① ※CSTD7がフタ プレドニン水溶性注(20mg)【AD】 40mg/m ² グラニセトロン点滴静注 1袋 パッパ(3mg/50mL)「HK」	100ml/h		10:00						
05	点滴 点滴注射(抗悪性腫瘍剤+無菌180) 全開で投与 ② ☆オンコビン注(1mg) 1.4mg/m ² 1.4V 生理食塩液50ml 1本 1.4 mg/m ²			10:30						
続き有り										
確認コメント プレドニン経口 40mg/m ² (day3-6)										
注意コメント 【RIT(375mg/m ² d1), q21】 HBV感染有無確認 【PSL(40mg/m ² d2-6), VCR(1.4mg/m ² d2), THP(40mg/m ² d2), CPA(650mg/m ² d2), q21】 リツキシマブ 投与速度初回: 0分 25mL/h, 60分後 100mL/h, 120分後 200mL/h リツキシマブ 投与速度2回目以降: 0分 100mL/h, 60分後 200mL/h プレドニン経口 40mg/m ² (day3-6) オンコビン最大投与量2mg 通常6~8コース施行										

レジメン番号 13708

レジメンマスタシート

2 / 2

発行日時 2024年11月22日 15時18分

レジメンNo. 0570850 診療科 血液・腫瘍内科

有効期間 2020/04/09~2099/12/31

レジメン名称 R-THPCOP(岐阜大プロトコール 70-79歳)

適用日数 21日 最大回数 25回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（主単位）	day (1)	day (2)					
		速度指示							
06	点滴 点滴注射（抗悪性腫瘍剤＋無菌1180） 全開で投与 ③ ☆ピノルビン注（20mg） 5％ブドウ糖注（50mL） 40 mg/m2	40mg/m ² 1本	2V	10:45					
07	点滴 点滴注射（速度指示）抗悪性腫瘍剤＋無菌1180 ④ ☆エンドキサン注（500mg） テルモ生食注（500ml） 650 mg/m2	250ml/h 650mg/m ² 1袋	1.3V	11:00					
08	点滴 点滴注射（速度指示） ルートフラッシュ用 ⑤ 生理食塩液50ml	200ml/h 1本		13:00					
終了									