

## レジメンマスタシート

1 / 2

発行日時 2024年11月21日 17時44分

レジメンNo. 0602541 診療科 消化器内科

有効期間 2024/06/13~2099/12/31

レジメン名称 SOX【130】+Pembrolizumab(200mg/body), q21

適用日数 21日 最大回数 99回

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント                                                                                                                                       | 1回投与量(主単位)<br>速度指示                            | day(1) |  |  |  |  |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|
|      |                                                                                                                                                   |                                               |        |  |  |  |  |  |  |
| 01   | 点滴<br>点滴注射(速度指示)<br>ルートキープ<br><br>主管より<br>①<br>※CSTD7タプタ<br>生理食塩液50ml<br><br>1本                                                                   | 200ml/h                                       | 10:00  |  |  |  |  |  |  |
| 02   | 点滴<br>点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180<br>30分かけて投与<br>主管より<br>②<br>インラインフィルタ-使用<br>☆キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL)<br>生理食塩液50ml<br>200mg/body                        | 100ml/h<br><br><br><br>200mg/Body<br>1本<br>2V | 10:15  |  |  |  |  |  |  |
| 03   | 点滴<br>点滴注射(速度指示)<br>フラッシュ用<br><br>主管より<br>③<br>生理食塩液50ml<br><br>1本                                                                                | 200ml/h                                       | 10:45  |  |  |  |  |  |  |
| 04   | 点滴<br>点滴注射(速度指示)<br>主管より<br>④<br>デキスト注射液(3.3mg/1ml)(イステル4mg)<br>【AD<br>ボラミン注(5mg/1ml)<br>パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイネ<br>」<br>大塚生食注(100ml)<br><br>1本 | 200ml/h                                       | 11:00  |  |  |  |  |  |  |
|      | 続き有り                                                                                                                                              |                                               |        |  |  |  |  |  |  |

## 確認コメント

TS-1はday1の夕から開始でday15の朝まで

## 注意コメント

Pembrolizumab: インラインフィルタ- (0.2~5 $\mu$ m)を使用し、30分かけて投与。  
最終濃度1~10mg/mlとなるよう希釈  
77°レ°タト併用時はDEXを合計4.95mgに減量すること(6.6mgまでは許容)。  
【Pembrolizumab(200mg/body d1), L-OHP(130mg/m2 d1), TS-1(80mg/m2/day d1-14), q21】

レジメン番号 14040

## レジメンマスタシート

2 / 2

発行日時 2024年11月21日 17時44分

レジメンNo. 0602541 診療科 消化器内科

有効期間 2024/06/13~2099/12/31

レジメン名称 SOX【130】+Pembrolizumab(200mg/body), q21

適用日数 21日 最大回数 99回

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント                                                                                                                                                  | 1回投与量(主単位)<br>速度指示                                             | day(1) |  |  |  |  |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|
|      |                                                                                                                                                              |                                                                |        |  |  |  |  |  |  |
| 05   | 点滴<br>点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180<br>主管より<br>⑤<br>(毒)エルプラット点滴静注液<br>(100mg/20mL)<br>デキスト注射液(3.3mg/1mL)(エステル4mg)<br>【AD<br>5%ブドウ糖注(500mL)<br>130 mg/m2<br>ホットパック使用 | 250ml/h<br><br><br>130mg/m <sup>2</sup><br>1.3V<br>3.3mg<br>1袋 | 11:30  |  |  |  |  |  |  |
| 06   | 点滴<br>点滴注射(速度指示)<br>WashOut用。<br>主管より<br>⑥<br>生理食塩液50mL                                                                                                      | 200ml/h<br><br><br>1本                                          | 13:30  |  |  |  |  |  |  |
| 終了   |                                                                                                                                                              |                                                                |        |  |  |  |  |  |  |

## 確認コメント

TS-1はday1の夕から開始でday15の朝まで

## 注意コメント

Pembrolizumab: インラインフィルタ(0.2~5μm)を使用し、30分かけて投与。

最終濃度1~10mg/mLとなるよう希釈

アプレビット併用時はDEXを合計4.95mgに減量すること(6.6mgまでは許容)。

【Pembrolizumab(200mg/body d1), L-OHP(130mg/m<sup>2</sup> d1), TS-1(80mg/m<sup>2</sup>/day d1-14), q21】

レジメン番号 14040