

レジメンマスタシート

1 / 3

発行日時 2024年11月21日 17時43分

レジメンNo. 060319 診療科 消化器内科

有効期間 2024/05/23~2099/12/31

レジメン名称 GC+Pembrolizumab (200mg/body) , q21

適用日数 21日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)	day (8)					
01	点滴 主管より ① ※CSTD7タフタ パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイパ」 アロカリス点滴静注(235mg/10mL) デキスト注射液(3.3mg/1mL)(エステル4mg) 【AD】 生理食塩液50mL	点滴注射(速度指示) 100ml/h 1V 1V 6.6mg 1本	10:00	10:00					
02	点滴 主管より ② 生理食塩液50mL	点滴注射(速度指示(基液または30mL/hrを超 200ml/h 1本	10:30						
03	点滴 主管より ③ インラインフィルター使用 ☆キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL) 生理食塩液50mL 200 mg/body	点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌1180 100ml/h 200mg/Body 1本 2V	10:45						
04	点滴 主管より ④ テルモ生食注(500mL)	点滴注射(速度指示) 500ml/h 1袋	11:15						
続き有り									

確認コメント
適宜補液を追加。注意コメント
【GEM(1g/m² d1,8), CDDP(25mg/m² d1,8),
Pembrolizumab(200mg/body d1), q21】
Pembrolizumabはインラインフィルター(0.2~0.5μm)を使用し、30分かけて投与。
Pembrolizumabの最終濃度1~10mg/mLとなるよう希釈。
KEYNOTE-966試験では8サイクル施行後CDDP中止、維持療法へ移行。

レジメン番号 14037

レジメンマスタシート

2 / 3

発行日時 2024年11月21日 17時43分

レジメンNo. 060319 診療科 消化器内科

有効期間 2024/05/23~2099/12/31

レジメン名称 GC+Pembrolizumab (200mg/body) , q21

適用日数 21日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)	day (8)					
05	点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 TOTAL 500 mLに調製 主管より ⑤ (毒)シスプラチン点滴静注 (50mg/100mL) 「マルコ」 テルモ生食注 (500ml) 25 mg/m2	500ml/h 25mg/m ² 1袋 0.5 V	12:15						
06	点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 主管より ⑥ ☆ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤルト」 大塚生食注 (100ml) 1000mg/m2	200ml/h 1000mg/m ² 1本 5 V	13:15						
07	点滴 点滴注射 (速度指示) 主管より ⑦ テルモ生食注 (500ml)	500ml/h 1袋	13:45						
08	点滴 点滴注射 (速度指示) 主管より ② テルモ生食注 (500ml)	500ml/h 1袋		10:30					
09	点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 TOTAL 500 mLに調製 主管より ③ (毒)シスプラチン点滴静注 (50mg/100mL) 「マルコ」 テルモ生食注 (500ml) 25 mg/m2	500ml/h 25mg/m ² 1袋 0.5 V		11:30					
続き有り									

確認コメント

適宜補液を追加。

注意コメント

【GEM (1g/m² d1, 8), CDDP (25mg/m² d1, 8),
Pembrolizumab (200mg/body d1), q21】
Pembrolizumabはインラインフィルター (0.2~0.5 μm) を使用し、30分かけて投与。
Pembrolizumabの最終濃度1~10mg/mLとなるよう希釈。
KEYNOTE-966試験では8サイクル施行後CDDP中止、維持療法へ移行。

レジメン番号 14037

レジメンマスタシート

3 / 3

発行日時 2024年11月21日 17時43分

レジメンNo. 060319 診療科 消化器内科

有効期間 2024/05/23~2099/12/31

レジメン名称 GC+Pembrolizumab (200mg/body) , q21

適用日数 21日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day (1)	day (8)						
10	点滴 主管より ④ ☆ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤルト」 大塚生食注(100ml) 1000mg/m2	点滴注射(速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌4180 200ml/h 1000mg/m ² 1本 5V		12:30						
11	点滴 主管より ⑤ テルモ生食注(500ml)	点滴注射(速度指示) 500ml/h 1袋		13:00						
終了										

確認コメント

適宜補液を追加。

注意コメント

【GEM(1g/m² d1, 8), CDDP(25mg/m² d1, 8),
Pembrolizumab(200mg/body d1), q21】
Pembrolizumabはインラインフィルター(0.2~0.5μm)を使用し、30分かけて投与。
Pembrolizumabの最終濃度1~10mg/mLとなるよう希釈。
KEYNOTE-966試験では8サイクル施行後CDDP中止、維持療法へ移行。

レジメン番号 14037