

# レジメンマスタシート

発行日時 2022年08月02日 16時49分

レジメンNo. 057121 診療科 血液・腫瘍内科  
 レジメン名称 A+AVD

有効期間 2019/11/14~2099/12/31  
 適用日数 28日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位)		day(1)	day(15)				
		速度指示							
01	点滴 点滴注射(速度指示) 主管より ① ※GSTD7が*ブ* パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイナ 」 生理食塩液50ml	100ml/h		10:00	10:00				
02	点滴 点滴注射(速度指示) ダカルバジンの側管より  側管より ② ソルデム3A輸液(500ml)	250ml/h		10:30	10:30				
03	点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌1180 2時間かけて投与 主管より ② ☆ダカルバジン注(100mg) 投与時、ルートも遮光。 大塚蒸留水(20ml) 溶解用 テルモ生食注(500ml) 375 mg/m <sup>2</sup>	250ml/h	375mg/m <sup>2</sup>	10:30	10:30	3.75V			
04	点滴 点滴注射(抗悪性腫瘍剤+無菌1180) 全開で投与 主管より ③ ☆ド*キルビ*シ*ン塩酸塩注射液 「サト*」(50mg/25mL) 生理食塩液50ml 25 mg/m <sup>2</sup>		25mg/m <sup>2</sup>	12:30	12:30	0.5V			
続き有り									

**確認コメント**  
原則最大12回(6コース)まで

**注意コメント**  
【ADM(25mg/m<sup>2</sup> d1, 15), VLB(6mg/m<sup>2</sup> d1, 15), DTIC(375mg/m<sup>2</sup> d1, 15)  
brentuximab vedotin(1.2mg/kg d1, 15), q28】  
アドセトリス最終濃度は0.4-1.2mg/mLとなるように調製  
体重100kgを超える場合は、100kgとしてアドセトリスの投与量計算

レジメン番号 13669

# レジメンマスタシート

発行日時 2022年08月02日 16時49分

レジメンNo. 057121 診療科 血液・腫瘍内科  
 レジメン名称 A+AVD

有効期間 2019/11/14~2099/12/31  
 適用日数 28日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位)		day(1)	day(15)					
		速度指示								
05	点滴 点滴注射(抗悪性腫瘍剤+無菌180) 全開で投与 主管より ④ ☆エクザール注(10mg) 生理食塩液50ml 6 mg/m2	6mg/m <sup>2</sup> 1本	0.6V	12:45	12:45					
06	点滴 点滴注射(速度指示) ルートフラッシュ用 主管より ⑤ 生理食塩液50ml	200ml/h		13:00	13:00					
07	点滴 点滴注射(速度指示) 主管より ⑥ ソル・コーテフ注射用(100mg)【AD】 ポララミン注(5mg/1ml) 生理食塩液50ml	100ml/h	1V 1A 1本	13:15	13:15					
08	点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 30分かけて投与 主管より ⑦ ☆アドセトリス点滴静注用50mg 1Vあたり注射用水10.5mLで溶解 注射液の濃度は5mg/mL 大塚生食注(100ml) 1.2 mg/kg	200ml/h	1.2mg/kg 1V 1本	13:45	13:45					
続き有り										

**確認コメント**  
原則最大12回(6コース)まで

**注意コメント**  
【ADM(25mg/m2 d1, 15), VLB(6mg/m2 d1, 15), DTIC(375mg/m2 d1, 15)  
brentuximab vedotin(1.2mg/kg d1, 15), q28】  
アドセトリス最終濃度は0.4-1.2mg/mLとなるように調製  
体重100kgを超える場合は、100kgとしてアドセトリスの投与量計算

レジメン番号 13669

# レジメンマスタシート

発行日時 2022年08月02日 16時49分

レジメンNo. 057121      診療科 血液・腫瘍内科  
 レジメン名称 A+AVD

有効期間 2019/11/14~2099/12/31  
 適用日数 28日      最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)	day (15)				
09	点滴      点滴注射 (速度指示) ルートフラッシュ用  主管より ⑧ 生理食塩液 50ml	200ml/h	14:15	14:15				
	終了							

確認コメント  
原則最大12回(6コース)まで

注意コメント  
 【ADM(25mg/m<sup>2</sup> d1, 15), VLB(6mg/m<sup>2</sup> d1, 15), DTIC(375mg/m<sup>2</sup> d1, 15)  
 brentuximab vedotin(1.2mg/kg d1, 15), q28】  
 アドセトリス最終濃度は0.4-1.2mg/mLとなるように調製  
 体重100kgを超える場合は、100kgとしてアドセトリスの投与量計算