

レジメンマスタシート

1 / 1

発行日時 2022年08月02日 17時01分

レジメンNo. 062004 診療科 乳腺・内分泌外科
 レジメン名称 FEC60

有効期間 2000/01/01~2099/12/31
 適用日数 21日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	速度指示	day(1)					
01	点滴 点滴注射 (速度指示) ① ※CSTD7がフタ 大塚生食注(100ml) 1本 テキサト注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg) 9.9mg 【AD パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイク 」 1V	200ml/h		10:00					
02	点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 ② 大塚生食注(100ml) 1本 500 mg/m2 ☆フルオロウラシル注「トワ」(250mg/5mL) 500mg/m ² 2A	200ml/h		10:30					
03	点滴 点滴注射(抗悪性腫瘍剤+無菌180) 全開で投与 ③ 空生食容器使用 生理食塩液50ml 1本 60 mg/m2 ☆ヒルルン塩酸塩注射液(50mg/25mL) 60mg/m ² 1.2V			11:00					
04	点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 主管より ④ 大塚生食注(100ml) 1本 500 mg/m2 ☆エンドキサン注(500mg) 500mg/m ² 1V	100ml/h		11:15					
05	点滴 点滴注射 (速度指示) フラッシュ用 ⑤ 生理食塩液50ml 1本	200ml/h		12:15					
終了									

確認コメント

注意コメント

【5-FU(500mg/m2 d1), EPI(60mg/m2 d1), CPA(500mg/m2 d1), q21]
 テキサト (8mg分2 d2-4), ランゾラール (15mg分1 d1-4)

レジメン番号 10104