

レジメンマスタシート

1 / 8

発行日時 2023年12月11日 14時59分

レジメンNo. 062341 診療科 乳腺・内分泌外科
 レジメン名称 Pembrolizumab+PTX+weekly CBDCA

有効期間 2022/09/16~2099/12/31
 適用日数 84日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)	day(8)	day(15)	day(22)	day(29)	day(36)	day(43)
01	点滴 点滴注射(速度指示) ① ※CSTD7ダフタ デキサト注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg) 【AD パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイ村 」 ガスター注(20mg/2ml) 大塚生食注(100ml)	400ml/h 9.9mg 1V 1A 1本	10:00			10:00			10:00
02	点滴 点滴注射(速度指示) 主管より ② 生理食塩液50ml	200ml/h 1本	10:15			10:15			10:15
03	点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 ③ インラインフィルター使用 ☆キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL) 200 mg/body 生理食塩液50ml	100ml/h 200mg/Body 2V 1本	10:30			10:30			10:30
04	点滴 点滴注射(速度指示) キイトルーダ用フラッシュ ④ 生理食塩液50ml	200ml/h 1本	11:00			11:00			11:00
05	点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 ⑤ インラインフィルター使用 5%大塚糖液(250ml) 80 mg/m ² (毒)パクリタキセル注NK (100mg/16.7mL)	250ml/h 1本 80mg/m ² 0.8V	11:15			11:15			11:15
続き有り									

確認コメント

CBDCA (AUC=1.5), sCr+0.2で計算。

注意コメント

【Pembro(200mg/body q21), PTX(80mg/m² q7), CBDCA(AUC=1.5 sCr+0.2補正 q7)q84].
 レスタミン錠10mg 5T(緑内障禁)
 Pembrolizumab:インラインフィルター(0.2~0.5μm)使用し、30分かけて投与。最終濃度1~10mg/mL

レジメン番号 13869

レジメンマスタシート

2 / 8

発行日時 2023年12月11日 14時59分

レジメンNo. 062341 診療科 乳腺・内分泌外科
 レジメン名称 Pembrolizumab+PTX+weekly CBDCA

有効期間 2022/09/16~2099/12/31
 適用日数 84日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)		day (1)	day (8)	day (15)	day (22)	day (29)	day (36)	day (43)
		速度指示								
06	点滴 ⑥ 5%大塚糖液(250ml) AUC=1.5 最大225mg (毒)カルボプラチン点滴静注液 NK(450mg/45ml)	点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌1180	250ml/h	12:15			12:15			12:15
07	点滴 ⑦ フラッシュ 生理食塩液50ml	点滴注射(速度指示)	200ml/h	13:15			13:15			13:15
08	点滴 主管より ① ※CSTD7タフタ デキスト注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg) 【AD 大塚生食注(100ml) パロノセトロン静注(0.75mg/5ml)「タイ林」 ガスター注(20mg/2ml)	点滴注射(速度指示)	400ml/h		10:00	10:00				
09	点滴 ② 大塚生食注(100ml)	点滴注射(速度指示)	200ml/h		10:15	10:15				
10	点滴 ③ インラインフィルター使用 5%大塚糖液(250ml) 80 mg/m ² (毒)パクリタキセル注NK (100mg/16.7ml)	点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌1180	250ml/h		10:45	10:45				
----- 続き有り -----										

確認コメント

CBDCA (AUC=1.5), sCr+0.2で計算。

注意コメント

【Pembro(200mg/body q21), PTX(80mg/m² q7), CBDCA(AUC=1.5 sCr+0.2補正 q7)q84】.
 レスタミン錠10mg 5T(緑内障禁)
 Pembrolizumab:インラインフィルター(0.2~0.5μm)使用し、30分かけて投与。最終濃度1~10mg/mL

レジメン番号 13869

レジメンマスタシート

3 / 8

発行日時 2023年12月11日 14時59分

レジメンNo. 062341 診療科 乳腺・内分泌外科
 レジメン名称 Pembrolizumab+PTX+weekly CBDCA

有効期間 2022/09/16~2099/12/31
 適用日数 84日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)	day(8)	day(15)	day(22)	day(29)	day(36)	day(43)
11	点滴 ④ 5%大塚糖液(250ml) AUC=1.5 最大225mg (毒)加林® プリン点滴静注液 NK(450mg/45mL)	点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌1180 250ml/h 1本 1mg/GFR+25 0.0022V		11:45	11:45				
12	点滴 ⑤ 生理食塩液50ml	点滴注射(速度指示) フラッシュ用 200ml/h 1本		12:45	12:45				
13	点滴 ① ※CSTDアダプタ パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイク 」 デキスト注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg) 【AD 大塚生食注(100ml) ガスター注(20mg/2ml)	点滴注射(速度指示) 400ml/h 1V 9.9mg 1本 1A					10:00	10:00	
14	点滴 ② 大塚生食注(100ml)	点滴注射(速度指示) 200ml/h 1本					10:15	10:15	
15	点滴 ③ インラインフィルター使用 5%大塚糖液(250ml) 80 mg/m ² (毒)パクリタキセル注NK (100mg/16.7mL)	点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌1180 250ml/h 1本 80mg/m ² 0.8V					10:45	10:45	
----- 続き有り -----									

確認コメント

CBDCA (AUC=1.5), sCr+0.2で計算。

注意コメント

【Pembro(200mg/body q21), PTX(80mg/m² q7), CBDCA(AUC=1.5 sCr+0.2補正 q7)q84】.
 レスタミン錠10mg 5T(緑内障禁)
 Pembrolizumab:インラインフィルター(0.2~0.5μm)使用し、30分かけて投与。最終濃度1~10mg/mL

レジメン番号 13869

レジメンマスタシート

4 / 8

発行日時 2023年12月11日 14時59分

レジメンNo. 062341 診療科 乳腺・内分泌外科

有効期間 2022/09/16~2099/12/31

レジメン名称 Pembrolizumab+PTX+weekly CBDCA

適用日数 84日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)	day(8)	day(15)	day(22)	day(29)	day(36)	day(43)
16	点滴 ④ 5%大塚糖液(250ml) AUC=1.5 最大225mg (毒)カルボプラチン点滴静注液 NK(450mg/45mL)	点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌1180 250ml/h 1本 1mg/GFR+25 0.0022V					11:45	11:45	
17	点滴 ⑤ 生理食塩液50ml	点滴注射(速度指示) フラッシュ用 1本					12:45	12:45	
	続き有り								

確認コメント

CBDCA (AUC=1.5), sCr+0.2で計算。

注意コメント

【Pembro(200mg/body q21), PTX(80mg/m2 q7), CBDCA(AUC=1.5 sCr+0.2補正 q7)q84】.
 レスタミン錠10mg 5T(緑内障禁)
 Pembrolizumab:インラインフィルター(0.2~0.5μm)使用し、30分かけて投与。最終濃度1~10mg/mL

レジメン番号 13869

レジメンマスタシート

5 / 8

発行日時 2023年12月11日 14時59分

レジメンNo. 062341 診療科 乳腺・内分泌外科
 レジメン名称 Pembrolizumab+PTX+weekly CBDCA

有効期間 2022/09/16~2099/12/31
 適用日数 84日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(50)	day(57)	day(64)	day(71)	day(78)		
01	点滴 点滴注射(速度指示) ① ※CSTD7ダ ^o フ ^o デキサト注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg) 【AD パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイ村 」 ガスター注(20mg/2ml) 大塚生食注(100ml)	400ml/h 9.9mg 1V 1A 1本			10:00				
02	点滴 点滴注射(速度指示) 主管より ② 生理食塩液50ml	200ml/h 1本			10:15				
03	点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 ③ インラインフィルター使用 ☆キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL) 200 mg/body 生理食塩液50ml	100ml/h 200mg/Body 2V 1本			10:30				
04	点滴 点滴注射(速度指示) キイトルーダ用フラッシュ ④ 生理食塩液50ml	200ml/h 1本			11:00				
05	点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 ⑤ インラインフィルター使用 5%大塚糖液(250ml) 80 mg/m ² (毒)パクリタキセル注NK (100mg/16.7mL)	250ml/h 1本 80mg/m ² 0.8V			11:15				
続き有り									

確認コメント

CBDCA (AUC=1.5), sCr+0.2で計算。

注意コメント

【Pembro(200mg/body q21), PTX(80mg/m² q7), CBDCA(AUC=1.5 sCr+0.2補正 q7)q84].
 レスタミン錠10mg 5T(緑内障禁)
 Pembrolizumab:インラインフィルター(0.2~0.5μm)使用し、30分かけて投与。最終濃度1~10mg/mL

レジメン番号 13869

レジメンマスタシート

レジメンNo. 062341 診療科 乳腺・内分泌外科
 レジメン名称 Pembrolizumab+PTX+weekly CBDCA

有効期間 2022/09/16~2099/12/31
 適用日数 84日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)		day (50)	day (57)	day (64)	day (71)	day (78)		
		速度指示								
06	点滴 ⑥ 5%大塚糖液(250ml) AUC=1.5 最大225mg (毒)カルボプラチン点滴静注液 NK(450mg/45mL)	点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌1180	250ml/h			12:15				
07	点滴 ⑦ フラッシュ 生理食塩液50ml	点滴注射(速度指示)	200ml/h			13:15				
18	点滴 主管より ① ※CSTD7タフタ デキスト注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg) 【AD 大塚生食注(100ml) パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイ林」 ガスター注(20mg/2ml)	点滴注射(速度指示)	400ml/h	10:00	10:00					
19	点滴 ② 大塚生食注(100ml)	点滴注射(速度指示)	200ml/h	10:15	10:15					
20	点滴 ③ インラインフィルター使用 5%大塚糖液(250ml) 80 mg/m ² (毒)パクリタキセル注NK (100mg/16.7mL)	点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌1180	250ml/h	10:45	10:45					
----- 続き有り -----										

確認コメント

CBDCA (AUC=1.5), sCr+0.2で計算。

注意コメント

【Pembro(200mg/body q21), PTX(80mg/m² q7), CBDCA(AUC=1.5 sCr+0.2補正 q7)q84].
 レスタミン錠10mg 5T(緑内障禁)
 Pembrolizumab:インラインフィルター(0.2~0.5μm)使用し、30分かけて投与。最終濃度1~10mg/mL

レジメンマスタシート

7 / 8

発行日時 2023年12月11日 14時59分

レジメンNo. 062341 診療科 乳腺・内分泌外科
 レジメン名称 Pembrolizumab+PTX+weekly CBDCA

有効期間 2022/09/16~2099/12/31
 適用日数 84日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)		day (50)	day (57)	day (64)	day (71)	day (78)
		速度指示						
21	点滴 点滴注射(速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌1180 ※CSTD7タフタ ④ 5%大塚糖液(250ml) AUC=1.5 最大225mg (毒)カルボプラチン点滴静注液 NK(450mg/45mL)	250ml/h		11:45	11:45			
22	点滴 点滴注射(速度指示) フラッシュ用 ⑤ 生理食塩液50ml	200ml/h		12:45	12:45			
23	点滴 点滴注射(速度指示) 主管より ① ※CSTD7タフタ パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイ林」 「キート」注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg) 【AD 大塚生食注(100ml) ガスター注(20mg/2ml)	400ml/h	1V 9.9mg 1本 1A				10:00	10:00
24	点滴 点滴注射(速度指示) ② 大塚生食注(100ml)	200ml/h	1本				10:15	10:15
25	点滴 点滴注射(速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌1180 ③ インラインフィルター使用 5%大塚糖液(250ml) 80 mg/m ² (毒)パクリタキセル注NK (100mg/16.7mL)	250ml/h	1本 80mg/m ² 0.8V				10:45	10:45
----- 続き有り -----								

確認コメント

CBDCA (AUC=1.5), sCr+0.2で計算。

注意コメント

【Pembro(200mg/body q21), PTX(80mg/m² q7), CBDCA(AUC=1.5 sCr+0.2補正 q7)q84].
 レスタミン錠10mg 5T(緑内障禁)
 Pembrolizumab:インラインフィルター(0.2~0.5μm)使用し、30分かけて投与。最終濃度1~10mg/mL

レジメン番号 13869

レジメンマスタシート

発行日時 2023年12月11日 14時59分

レジメンNo. 062341 診療科 乳腺・内分泌外科

有効期間 2022/09/16~2099/12/31

レジメン名称 Pembrolizumab+PTX+weekly CBDCA

適用日数 84日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)		day (50)	day (57)	day (64)	day (71)	day (78)		
		速度指示								
26	点滴 ④ 5%大塚糖液(250ml) AUC=1.5 最大225mg (毒)カルボプラチン点滴静注液 NK(450mg/45mL)	点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌1180	250ml/h				11:45	11:45		
			1本							
			1mg/GFR+25							0.0022 V
27	点滴 ⑤ 生理食塩液50ml	点滴注射(速度指示) フラッシュ用	200ml/h				12:45	12:45		
終了										

確認コメント

CBDCA (AUC=1.5), sCr+0.2で計算。

注意コメント

【Pembro(200mg/body q21), PTX(80mg/m2 q7), CBDCA(AUC=1.5 sCr+0.2補正 q7)q84】.
 レスタミン錠10mg 5T(緑内障禁)
 Pembrolizumab:インラインフィルター(0.2~0.5μm)使用し、30分かけて投与。最終濃度1~10mg/mL