

レジメンマスタシート

1 / 6

発行日時 2023年12月11日 14時59分

レジメンNo. 062342 診療科 乳腺・内分泌外科
 レジメン名称 Pembrolizumab+PTX+tri CBDCA

有効期間 2022/10/01~2099/12/31
 適用日数 84日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)	day(8)	day(15)	day(22)	day(29)	day(36)	day(43)
01	点滴 ① ※CSTD7タ ^o フ ^o タ デ ^o キ ^o サ ^o ト注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg) 【AD パ ^o ロ ^o ノ ^o セ ^o ト ^o ロン静注(0.75mg/5mL)「タイ ^o 林 ^o 」 ガ ^o ス ^o ター注(20mg/2ml) 大 ^o 塚 ^o 生 ^o 食 ^o 注(100ml)	点滴注射(速度指示) 400ml/h	10:00			10:00			10:00
02	点滴 ② 生理食塩液50ml	点滴注射(速度指示) 200ml/h	10:15			10:15			10:15
03	点滴 ③ イン ^o フ ^o ィ ^o ル ^o ター使用 ☆キ ^o イ ^o ト ^o ル ^o ー ^o ダ ^o 点滴静注(100mg/4mL) 200 mg/body 生理食塩液50ml	点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 100ml/h 200mg/Body 2V	10:30			10:30			10:30
04	点滴 ④ キ ^o イ ^o ト ^o ル ^o ー ^o 用フラッシュ 生理食塩液50ml	点滴注射(速度指示) 200ml/h	11:00			11:00			11:00
05	点滴 ⑤ イン ^o フ ^o ィ ^o ル ^o ター使用 5%大塚糖液(250ml) 80 mg/m ² (毒)パ ^o ク ^o リ ^o タ ^o キ ^o セル注NK (100mg/16.7mL)	点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 250ml/h 80mg/m ² 0.8V	11:15			11:15			11:15
続き有り									

確認コメント
 CBDCA (AUC=5), sCr+0.2で計算

注意コメント
 【Pembro(200mg/body q21), PTX(80mg/m² q7), CBDCA(AUC=5 sCr+0.2補正 q21)q84】.
 レ^oス^oタ^oミ^o錠10mg 5T(緑内障禁), イ^oメ^oド, テ^oカ^oド^oロン, ラ^oソ^oフ^oラ^oソ^oール併用
 Pembrolizumab:イン^oフ^oィ^oル^oター(0.2~0.5μm)使用し、30分かけて投与。最終濃度1~10mg/mL

レジメン番号 13867

レジメンマスタシート

2 / 6

発行日時 2023年12月11日 14時59分

レジメンNo. 062342 診療科 乳腺・内分泌外科
 レジメン名称 Pembrolizumab+PTX+tri CBDCA

有効期間 2022/10/01~2099/12/31
 適用日数 84日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (主単位)		day (1)	day (8)	day (15)	day (22)	day (29)	day (36)	day (43)
		速度指示								
06	点滴 ⑥ 5%大塚糖液(250ml) AUC=5 最大750mg (毒)カルボプラチン点滴静注液 NK(450mg/45mL)	点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌1180	250ml/h	12:15			12:15			12:15
07	点滴 ⑦ 生理食塩液50ml	点滴注射(速度指示) フラッシュ用	200ml/h	13:15			13:15			13:15
08	点滴 ① ※CSTDアダプタ デキスト注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg) 【AD 生理食塩液50ml ガスター注(20mg/2ml)	点滴注射(速度指示)	200ml/h		10:00	10:00				
09	点滴 ② 大塚生食注(100ml)	点滴注射(速度指示)	200ml/h		10:15	10:15				
10	点滴 ③ インラインフィルター使用 5%大塚糖液(250ml) 80 mg/m ² (毒)パクリタキセル注NK (100mg/16.7mL)	点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌1180	250ml/h		10:45	10:45				
----- 続き有り -----										

確認コメント

CBDCA (AUC=5), sCr+0.2で計算

注意コメント

【Pembro(200mg/body q21), PTX(80mg/m² q7), CBDCA(AUC=5 sCr+0.2補正 q21)q84].
 レスタミン錠10mg 5T(緑内障禁), イメット, デキストロン, ランソプラゾール併用
 Pembrolizumab:インラインフィルター(0.2~0.5µm)使用し、30分かけて投与。最終濃度1~10mg/mL

レジメン番号 13867

レジメンマスタシート

3 / 6

発行日時 2023年12月11日 14時59分

レジメンNo. 062342 診療科 乳腺・内分泌外科
 レジメン名称 Pembrolizumab+PTX+tri CBDCA

有効期間 2022/10/01~2099/12/31
 適用日数 84日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (主単位)		day (1)	day (8)	day (15)	day (22)	day (29)	day (36)	day (43)
		速度指示								
11	点滴 点滴注射 (速度指示) フラッシュ用 ④ 生理食塩液 50ml	200ml/h			11:45	11:45				
12	点滴 点滴注射 (速度指示) ① ※CSTD7タフタ テキト注射液 (6.6mg/2ml) (エステル8mg) 【AD】 生理食塩液 50ml ガスター注 (20mg/2ml)	200ml/h						10:00	10:00	
13	点滴 点滴注射 (速度指示) ② 大塚生食注 (100ml)	200ml/h						10:15	10:15	
14	点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌1180 ③ インラインフィルター使用 5%大塚糖液 (250ml) 80 mg/m ² (毒)パクリタキセル注NK (100mg/16.7mL)	250ml/h						10:45	10:45	
15	点滴 点滴注射 (速度指示) フラッシュ用 ④ 生理食塩液 50ml	200ml/h						11:45	11:45	
続き有り										

確認コメント
 CBDCA (AUC=5), sCr+0.2で計算

注意コメント
 【Pembro (200mg/body q21), PTX (80mg/m² q7), CBDCA (AUC=5 sCr+0.2補正 q21) q84】.
 レスタミン錠10mg 5T (緑内障禁), イメット, テカドロン, ランソプラゾール併用
 Pembrolizumab:インラインフィルター (0.2~0.5μm) 使用し、30分かけて投与。最終濃度1~10mg/mL

レジメン番号 13867

レジメンマスタシート

4 / 6

発行日時 2023年12月11日 14時59分

レジメンNo. 062342 診療科 乳腺・内分泌外科
 レジメン名称 Pembrolizumab+PTX+tri CBDCA

有効期間 2022/10/01~2099/12/31
 適用日数 84日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(50)	day(57)	day(64)	day(71)	day(78)		
01	点滴 ① ※CSTD7タ [®] フ [®] タ デ [®] キ [®] ト注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg) 【AD パ [®] ロ [®] ノセ [®] ト [®] ロン [®] 静注(0.75mg/5mL)「タイ [®] 林 [®] 」 ↓ ガ [®] ス [®] ター [®] 注(20mg/2ml) 大 [®] 塚 [®] 生 [®] 食 [®] 注(100ml)	点滴注射(速度指示) 400ml/h			10:00				
02	点滴 ② 生理食塩液50ml	点滴注射(速度指示) 200ml/h			10:15				
03	点滴 ③ イン [®] フ [®] ィ [®] ル [®] ター [®] 使用 ☆キ [®] イ [®] ト [®] ルー [®] ダ [®] 点滴 [®] 静 [®] 注(100mg/4mL) 200 mg/body 生理食塩液50ml	点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 100ml/h 200mg/Body 2V			10:30				
04	点滴 ④ キ [®] イ [®] ト [®] ルー [®] ダ [®] 用 [®] フ [®] ラ [®] ッシュ 生理食塩液50ml	点滴注射(速度指示) 200ml/h			11:00				
05	点滴 ⑤ イン [®] フ [®] ィ [®] ル [®] ター [®] 使用 5%大塚糖液(250ml) 80 mg/m ² (毒)パ [®] ク [®] リ [®] タ [®] キ [®] セル [®] 注 [®] N [®] K (100mg/16.7mL)	点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 250ml/h 80mg/m ² 0.8V			11:15				
----- 続き有り -----									

確認コメント
 CBDCA (AUC=5), sCr+0.2で計算

注意コメント
 【Pembro(200mg/body q21), PTX(80mg/m² q7), CBDCA(AUC=5 sCr+0.2補正 q21)q84】.
 レ[®]ス[®]タ[®]ミン[®]錠10mg 5T(緑内障禁), イ[®]メ[®]ド[®], テ[®]カ[®]ド[®]ロン[®], ラ[®]ソ[®]フ[®]ラ[®]ソ[®]ール[®]併用
 Pembrolizumab:イン[®]フ[®]ィ[®]ル[®]ター[®](0.2~0.5μm)使用し、30分かけて投与。最終濃度1~10mg/mL

レジメン番号 13867

レジメンマスタシート

5 / 6

発行日時 2023年12月11日 14時59分

レジメンNo. 062342 診療科 乳腺・内分泌外科
 レジメン名称 Pembrolizumab+PTX+tri CBDCA

有効期間 2022/10/01~2099/12/31
 適用日数 84日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (主単位)		day (50)	day (57)	day (64)	day (71)	day (78)		
		速度指示								
06	点滴 ⑥ 5%大塚糖液(250ml) AUC=5 最大750mg (毒)カルボプラチン点滴静注液 NK(450mg/45mL)	点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌1180	250ml/h			12:15				
07	点滴 ⑦ 生理食塩液50ml	点滴注射(速度指示) フラッシュ用	200ml/h			13:15				
16	点滴 ① ※CSTDアダプタ デキスト注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg) 【AD 生理食塩液50ml ガスター注(20mg/2ml)	点滴注射(速度指示)	200ml/h	10:00	10:00					
17	点滴 ② 大塚生食注(100ml)	点滴注射(速度指示)	200ml/h	10:15	10:15					
18	点滴 ③ インラインフィルター使用 5%大塚糖液(250ml) 80 mg/m ² (毒)パクリタキセル注NK (100mg/16.7mL)	点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌1180	250ml/h	10:45	10:45					
----- 続き有り -----										

確認コメント

CBDCA (AUC=5), sCr+0.2で計算

注意コメント

【Pembro(200mg/body q21), PTX(80mg/m² q7), CBDCA(AUC=5 sCr+0.2補正 q21)q84】.
 レスタミン錠10mg 5T(緑内障禁), イメット, デキストロン, ランソプラゾール併用
 Pembrolizumab:インラインフィルター(0.2~0.5µm)使用し、30分かけて投与。最終濃度1~10mg/mL

レジメン番号 13867

レジメンマスタシート

6 / 6

発行日時 2023年12月11日 14時59分

レジメンNo. 062342 診療科 乳腺・内分泌外科

有効期間 2022/10/01~2099/12/31

レジメン名称 Pembrolizumab+PTX+tri CBDCA

適用日数 84日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (主単位) 速度指示	day (50)	day (57)	day (64)	day (71)	day (78)		
19	点滴 点滴注射 (速度指示) フラッシュ用 ④ 生理食塩液 50ml	200ml/h 1本	11:45	11:45					
20	点滴 点滴注射 (速度指示) ① ※CSTD7タフタ テカト注射液 (6.6mg/2ml) (エステル8mg) 【AD 生理食塩液 50ml ガスター注 (20mg/2ml)	200ml/h 6.6mg 1本 1A				10:00	10:00		
21	点滴 点滴注射 (速度指示) ② 大塚生食注 (100ml)	200ml/h 1本				10:15	10:15		
22	点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌1180 ③ インラインフィルター使用 5%大塚糖液 (250ml) 80 mg/m ² (毒)パクリタキセル注NK (100mg/16.7mL)	250ml/h 1本 80mg/m ² 0.8V				10:45	10:45		
23	点滴 点滴注射 (速度指示) フラッシュ用 ④ 生理食塩液 50ml	200ml/h 1本				11:45	11:45		
終了									

確認コメント

CBDCA (AUC=5), sCr+0.2で計算

注意コメント

【Pembro (200mg/body q21), PTX (80mg/m² q7), CBDCA (AUC=5 sCr+0.2補正 q21) q84】.
 レスタミン錠10mg 5T (緑内障禁), イメット, テカトロン, ランソプラゾール併用
 Pembrolizumab:インラインフィルター(0.2~0.5μm)使用し、30分かけて投与。最終濃度1~10mg/mL

レジメン番号 13867