

レジメンマスタシート

1 / 6

発行日時 2023年12月11日 15時00分

レジメンNo. 062346 診療科 乳腺・内分泌外科
 レジメン名称 Pembrolizumab+Abraxane

有効期間 2022/09/15~2099/12/31
 適用日数 84日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)	day(8)	day(15)	day(29)	day(36)	day(43)	day(57)
01	点滴 点滴注射(速度指示) 主管より ① ※CSTD7タフタ 生理食塩液50ml 1本	200ml/h	10:00					10:00	
02	点滴 点滴注射(速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 主管より ② インラインフィルター使用 ☆キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL) 400 mg/body 生理食塩液50ml 1本	100ml/h	10:15					10:15	
03	点滴 点滴注射(速度指示) キイトルーダ用フラッシュ 主管より ③ 生理食塩液50ml 1本	200ml/h	10:45					10:45	
04	点滴 点滴注射(速度指示) 側管より ① グラニセトロン点滴静注 パック(3mg/50mL)「HK」 1袋	100ml/h	11:00					11:00	
05	点滴 点滴注射(速度指示) 側管より ② 生理食塩液50ml 1本	200ml/h	11:30					11:30	
続き有り									

確認コメント

注意コメント

Pembrolizumab:インラインフィルター(0.2~0.5μm)使用し、30分かけて投与。最終濃度1~10mg/mL
 【Pembro(400mg/body d1, 43), Abraxane(100mg/m2 d1, 8, 15, 29, 36, 43, 57, 64, 71), q84】

レジメン番号 13866

レジメンマスタシート

発行日時 2023年12月11日 15時00分

レジメンNo. 062346 診療科 乳腺・内分泌外科
 レジメン名称 Pembrolizumab+Abraxane

有効期間 2022/09/15~2099/12/31
 適用日数 84日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位)		day(1)	day(8)	day(15)	day(29)	day(36)	day(43)	day(57)
		速度指示								
06	点滴 点滴注射(速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 100ml/h 30分かけて投与 空生食容器使用 側管より ③ インラインフィルター不可 生理食塩液50ml 1本 100mg/m ² (毒) アブラキサ点静注用(100mg) 100mg/m ² 1V			11:45					11:45	
07	点滴 点滴注射(速度指示) フラッシュ用 側管より ④ 生理食塩液50ml 1本		200ml/h	12:15					12:15	
08	点滴 点滴注射(速度指示) 主管より ① ※CSTD7タフタ グラニセトロン点滴静注 パック(3mg/50mL)「HK」 1袋		100ml/h		10:00	10:00				
09	点滴 点滴注射(速度指示) 主管より ② 生理食塩液50ml 1本		200ml/h		10:30	10:30				
----- 続き有り -----										

確認コメント

注意コメント

Pembrolizumab:インラインフィルター(0.2~0.5μm)使用し、30分かけて投与。最終濃度1~10mg/mL
 【Pembro(400mg/body d1, 43), Abraxane(100mg/m² d1, 8, 15, 29, 36, 43, 57, 64, 71), q84】

レジメン番号 13866

レジメンマスタシート

3 / 6

発行日時 2023年12月11日 15時00分

レジメンNo. 062346 診療科 乳腺・内分泌外科

有効期間 2022/09/15~2099/12/31

レジメン名称 Pembrolizumab+Abraxane

適用日数 84日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)	day(8)	day(15)	day(29)	day(36)	day(43)	day(57)
10	点滴 点滴注射(速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 30分かけて投与 空生食容器使用 主管より ③ インラインフィルター不可 生理食塩液50ml 100mg/m ² (毒) アブラキサ点静注用(100mg)	100ml/h 1本 100mg/m ²		10:45	10:45				
11	点滴 点滴注射(速度指示) フラッシュ用 主管より ④ 生理食塩液50ml	200ml/h 1本		11:15	11:15				
12	点滴 点滴注射(速度指示) 主管より ① ※CSTD7タフタ グラニセトロン点静注 ハック(3mg/50mL)「HK」	100ml/h 1袋				10:00	10:00		
13	点滴 点滴注射(速度指示) 主管より ② 生理食塩液50ml	200ml/h 1本				10:30	10:30		
	続き有り								

確認コメント

注意コメント

Pembrolizumab:インラインフィルター(0.2~0.5μm)使用し、30分かけて投与。最終濃度1~10mg/mL
【Pembro(400mg/body d1, 43), Abraxane(100mg/m² d1, 8, 15, 29, 36, 43, 57, 64, 71), q84】

レジメン番号 13866

レジメンマスタシート

4 / 6

発行日時 2023年12月11日 15時00分

レジメンNo. 062346 診療科 乳腺・内分泌外科
 レジメン名称 Pembrolizumab+Abraxane

有効期間 2022/09/15~2099/12/31
 適用日数 84日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位)		day(1)	day(8)	day(15)	day(29)	day(36)	day(43)	day(57)
		速度指示								
14	点滴 点滴注射(速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 100ml/h 30分かけて投与 空生食容器使用 主管より ③ インラインフィルタ-不可 生理食塩液50ml 1本 100mg/m ² (毒) アブラキサ点静注用(100mg) 100mg/m ² 1V						10:45	10:45		
15	点滴 点滴注射(速度指示) フラッシュ用 主管より ④ 生理食塩液50ml 1本						11:15	11:15		
16	点滴 点滴注射(速度指示) 主管より ① ※CSTD7タフタ グラニセトロン点滴静注 ハック(3mg/50mL)「HK」 1袋									10:00
17	点滴 点滴注射(速度指示) 主管より ② 生理食塩液50ml 1本									10:30
----- 続き有り -----										

確認コメント

注意コメント

Pembrolizumab:インラインフィルタ-(0.2~0.5μm)使用し、30分かけて投与。最終濃度1~10mg/mL
 【Pembro(400mg/body d1, 43), Abraxane(100mg/m² d1, 8, 15, 29, 36, 43, 57, 64, 71), q84】

レジメン番号 13866

レジメンマスタシート

5 / 6

発行日時 2023年12月11日 15時00分

レジメンNo. 062346 診療科 乳腺・内分泌外科

有効期間 2022/09/15~2099/12/31

レジメン名称 Pembrolizumab+Abraxane

適用日数 84日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位)		day(1)	day(8)	day(15)	day(29)	day(36)	day(43)	day(57)
		速度指示								
18	点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 100ml/h 30分かけて投与 空生食容器使用 主管より ③ インラインフィルタ-不可 生理食塩液50ml 1本 100 mg/m ² (毒) アブラキサ点静注用(100mg) 100mg/m ² 1V									10:45
19	点滴 点滴注射(速度指示) フラッシュ用 200ml/h 主管より ④ 生理食塩液50ml 1本 続き有り									11:15

確認コメント

注意コメント

Pembrolizumab:インラインフィルタ-(0.2~0.5μm)使用し、30分かけて投与。最終濃度1~10mg/mL
 【Pembro(400mg/body d1, 43), Abraxane(100mg/m² d1, 8, 15, 29, 36, 43, 57, 64, 71), q84】

レジメン番号 13866

レジメンマスタシート

6 / 6

発行日時 2023年12月11日 15時00分

レジメンNo. 062346 診療科 乳腺・内分泌外科
 レジメン名称 Pembrolizumab+Abraxane

有効期間 2022/09/15~2099/12/31
 適用日数 84日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(64)	day(71)					
16	点滴 点滴注射(速度指示) 主管より ① ※CSTD7タフタ グラニセトロン点滴静注 パック(3mg/50mL)「HK」	100ml/h 1袋	10:00	10:00					
17	点滴 点滴注射(速度指示) 主管より ② 生理食塩液50ml	200ml/h 1本	10:30	10:30					
18	点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 30分かけて投与 空生食容器使用 主管より ③ インラインフィルター不可 生理食塩液50ml 100mg/m ² (毒)アブラキサ点静注用(100mg)	100ml/h 100mg/m ² 1V	10:45	10:45					
19	点滴 点滴注射(速度指示) フラッシュ用 主管より ④ 生理食塩液50ml	200ml/h 1本	11:15	11:15					
終了									

確認コメント

注意コメント

Pembrolizumab:インラインフィルター(0.2~0.5µm)使用し、30分かけて投与。最終濃度1~10mg/mL
 【Pembro(400mg/body d1, 43), Abraxane(100mg/m² d1, 8, 15, 29, 36, 43, 57, 64, 71), q84】

レジメン番号 13866