

レジメンマスタシート

発行日時 2023年12月11日 14時33分

レジメンNo. 057223 診療科 血液・腫瘍内科
 レジメン名称 E-Pd(維持)(3サイクル目以降)

有効期間 2020/03/26~2099/12/31
 適用日数 28日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)					
01	点滴 点滴注射(速度指示) ① ※CSTD7タ°フタ テ°キート注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg) 6.6mg 【AD ポラミン注(5mg/1ml) 1A ガスター注(20mg/2ml) 1A 生理食塩液50ml 1本 エムプリシティ投与45分前に投与終了	200ml/h	10:00					
02	点滴 点滴注射(速度指示) 経過観察時投与用 ② 大塚生食注(100ml) 1本	133ml/h	10:15					
03	点滴 点滴注射(抗悪性腫瘍剤+無菌1180) ③ インラインフィルター使用 ☆エムプリシティ点滴静注用(400mg) 20mg/kg 0.05V 注射用水PL「フソー」(100ml) 1V 大塚生食注(250ml) 1本 20 mg/kg		11:00					
04	点滴 点滴注射(速度指示) フラッシュ用 ④ 生理食塩液50ml 1本	100ml/h	○					
終了								

確認コメント

レタ°ックス, カナール, ホ°マリスト内服処方確認

注意コメント

【Elo(20mg/kg, d1), ホ°マリスト(4mg/body, d1-21),
 DEX(8+28mg/body, d1), (40mg/body, d8, 15, 22) q28】
 ホ°マリスト内服 4mg/body, d1-21 レタ°ックス内服 28mg/body (d1), 40mg/body (d8, 15, 22)
 エム°リシティ投与速度:3サイクル目:0分 180mL/h, 30分後 240mL/h, 4サイクル目以降:300mL/h
 前投薬としてレタ°ックス錠4mg 7錠を3-24時間前に投与 投与前にカナール錠300mg 2錠内服