

レジメンマスタシート

レジメンNo. 060412 診療科 消化器外科

有効期間 2010/10/28~2099/12/31

レジメン名称 Pmab+mFOLFOX6

適用日数 14日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	速度指示	day (1)						
01	点滴 点滴注射 (速度指示) 主管より ① ※CSTDアダプタ ポラミン注 (5mg/1ml) デキスト注射液 (6.6mg/2ml) (エステル8mg) 【AD グラニセトロン点滴静注 ハック (3mg/50mL) 「HK」	100ml/h	1A 9.9mg 1袋	10:00						
02	点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 60分かけて投与 インラインフィルター使用。 主管より ② ☆ベクティビックス点滴静注 (100mg/5ml) 大塚生食注 (100ml) 6 mg/kg 調整濃度: 10mg/mLを超えないこと	100ml/h	6mg/kg 1本	10:30						
03	点滴 点滴注射 (速度指示) 主管より ③ 生理食塩液 50ml	100ml/h	1本	11:30						
04	点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 主管より ④ (毒)エルプラット点滴静注 (100mg/20mL) 5%大塚糖液 (250ml) 85 mg/m ²	125ml/h	85mg/m ² 1本	12:00						
……… 続き有り ……										

確認コメント

イメット併用時はDEX4.95mgに減量

注意コメント

【P-mab (6mg/kg d1), L-OHP (85mg/m² d1), LV (200mg/m² d1), 5FU (400mg/m² d1, 2400mg/m² d1), q14】
P-mab: 1回投与量1000mg以上の場合は、希釈し約150mLとし、90分以上かけて投与

レジメンマスタシート

レジメンNo. 060412 診療科 消化器外科

有効期間 2010/10/28~2099/12/31

レジメン名称 Pmab+mFOLFOX6

適用日数 14日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	速度指示	day (1)						
05	点滴 点滴注射 (速度指示) ※エルプラットと同時に投与。 側管より ④ レボホリナート点滴静注用100mg 「ヤクル」 5%大塚糖液(250ml) 200mg/m ²	200mg/m ²	125ml/h	12:00						
06	点滴 点滴注射 (速度指示) エルプラット投与後フラッシュ 主管より ⑤ 生理食塩液50ml	1本	125ml/h	14:00						
07	点滴 点滴注射 (抗悪性腫瘍剤+無菌1180) 全開で投与 主管より ⑥ ☆フルオロウラシル注「ト-ワ」(250mg/5mL) 400mg/m ² 生理食塩液50ml	400mg/m ²		○						
08	点滴 点滴注射 全開で投与 5FUbolus投与後フラッシュ 主管より ⑦ 生理食塩液50ml	1本		○						
----- 続き有り -----										

確認コメント

イメット併用時はDEX4.95mgに減量

注意コメント

【P-mab (6mg/kg d1), L-OHP (85mg/m² d1), LV (200mg/m² d1), 5FU (400mg/m² d1, 2400mg/m² d1), q14】
 P-mab: 1回投与量1000mg以上の場合は、希釈し約150mLとし、90分以上かけて投与

レジメンマスタシート

3 / 3

発行日時 2022年08月02日 16時58分

レジメンNo. 060412 診療科 消化器外科

有効期間 2010/10/28~2099/12/31

レジメン名称 Pmab+mFOLF0X6

適用日数 14日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day(1)				
09	静脈内 抗悪性腫瘍剤静脈内局所持続注入 TOTAL: 130 mLに調製 主管より ⑧ ヘパリンNa注(5千単位/5mL)「モチダ」 5000単位 ※インフューザーポンプ使用。 ☆フルオロウラシル注「ト-7」(250mg/5mL) 2400mg/m ² 9.6 A 大塚生食注(100ml) 1本 2400mg/m ² bolus投与終了後		○				
	終了						

確認コメント

イメド 併用時はDEX4. 95mgに減量

注意コメント

【P-mab(6mg/kg d1), L-OHP(85mg/m² d1), LV(200mg/m² d1),
 5FU(400mg/m² d1, 2400mg/m² d1), q14】
 P-mab: 1回投与量1000mg以上の場合は、希釈し約150mLとし、90分以上かけて投与