

# レジメンマスタシート

レジメンNo. 0604902 診療科 消化器外科  
 レジメン名称 C-mab+CPT-11 (2回目以降)

有効期間 2013/12/12~2099/12/31  
 適用日数 14日 最大回数 99回

| RpNo             | 薬剤名/手技/コメント  | 1回投与量 (主単位) | 速度指示 | day (1) | day (8) |  |  |  |  |
|------------------|--|-------------|------|---------|---------|--|--|--|--|
| 01               | 点滴 点滴注射 (速度指示)<br>主管より<br>①<br>※CSTD7がフタ<br>ポララミン注(5mg/1ml) 1A<br>パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイ村」 1V<br>↓<br>テキサト注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg) 6.6mg<br>【AD<br>生理食塩液50ml 1本 | 200ml/h     |      | 10:00   |         |  |  |  |  |
| 02               | 点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180<br>TOTAL 250 mLに調製<br>60分かけて投与<br>主管より<br>②<br>☆アービタックス注射用100mg 250mg/m <sup>2</sup> 2.5V<br>大塚生食注(250ml) 1本<br>250 mg/m <sup>2</sup>  | 250ml/h     |      | 10:15   |         |  |  |  |  |
| 03               | 点滴 点滴注射 (速度指示)<br>C-mab後フラッシュ(速度注意)<br>主管より<br>③<br>生理食塩液50ml 1本   | 250ml/h     |      | 11:15   |         |  |  |  |  |
| 04               | 点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180<br>90分かけて投与<br>主管より<br>④<br>☆イリテカン塩酸塩点滴静注 150mg/m <sup>2</sup> 1.5V<br>「SUN」(100mg/5mL)<br>5%大塚糖液(250ml) 1本<br>150 mg/m <sup>2</sup>   | 167ml/h     |      | 11:30   |         |  |  |  |  |
| ----- 続き有り ----- |  |             |      |         |         |  |  |  |  |

**確認コメント**

アービタックス2回目以降。初回は別レジメンで。

**注意コメント**

【C-mab(250mg/m<sup>2</sup> d1・8), CPT-11(150mg/m<sup>2</sup> d1), q14]  
 C-mab250mg/m<sup>2</sup>を1時間で。ルートフラッシュも同速度で。

# レジメンマスタシート

2 / 2

発行日時 2022年08月02日 16時59分

レジメンNo. 0604902 診療科 消化器外科  
 レジメン名称 C-mab+CPT-11 (2回目以降)

有効期間 2013/12/12~2099/12/31  
 適用日数 14日 最大回数 99回

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント  | 1回投与量 (主単位) | 速度指示 | day (1) | day (8) |  |  |  |  |
|------|--|-------------|------|---------|---------|--|--|--|--|
| 05   | 点滴 点滴注射 (速度指示)<br>CPT-11後フラッシュ<br>主管より<br>⑤<br>生理食塩液 50ml  | 250ml/h     |      | ○       |         |  |  |  |  |
| 06   | 点滴 点滴注射 (速度指示)<br>主管より<br>①<br>※CSTDアダプタ<br>ポラミン注 (5mg/1ml)<br>デキスト注射液 (6.6mg/2ml) (イソル8mg)<br>【AD<br>生理食塩液 50ml                       | 200ml/h     |      |         | 10:00   |  |  |  |  |
| 07   | 点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌1180<br>TOTAL 250 mLに調製<br>60分かけて投与<br>主管より<br>②<br>☆アービタックス注射用100mg<br>大塚生食注 (250ml)<br>250 mg/m <sup>2</sup> | 250ml/h     |      |         | 10:15   |  |  |  |  |
| 08   | 点滴 点滴注射 (速度指示)<br>C-mab後フラッシュ (速度注意)<br>主管より<br>③<br>生理食塩液 50ml  | 250ml/h     |      |         | ○       |  |  |  |  |
| 終了   |  |             |      |         |         |  |  |  |  |

**確認コメント**

アービタックス2回目以降。初回は別レジメンで。

**注意コメント**

【C-mab (250mg/m<sup>2</sup> d1・8), CPT-11 (150mg/m<sup>2</sup> d1), q14】  
 C-mab 250mg/m<sup>2</sup> を1時間で。ルートフラッシュも同速度で。

レジメン番号 13195