

レジメンマスタシート

1 / 2

発行日時 2022年08月02日 16時47分

レジメンNo. 057083 診療科 血液・腫瘍内科
 レジメン名称 R-Bendamustine療法（リツキサン同日投与）

有効期間 2011/05/02~2099/12/31
 適用日数 28日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（主単位） 速度指示	day(1)	day(2)				
01	点滴 点滴注射（速度指示） ① ※CSTD7ダフタ ポララミン注(5mg/1ml) 1A ソル・コーテフ注射用(100mg)【AD】 1V 生理食塩液50ml 1本	100ml/h	10:00					
02	点滴 点滴注射(抗悪性腫瘍剤+無菌1180) 10:30~ ② ☆リツキサン注500mg/50ml 375mg/m ² テルモ生食注(500ml) 1袋 0.75V 正式には1mg/mLの濃度に 375 mg/m ²		10:30					
03	点滴 点滴注射（速度指示） リツキサン終了後ルートフラッシュ用 ③ 生理食塩液50ml 1本	200ml/h	○					
04	点滴 点滴注射（速度指示） ④ パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイ林」 生理食塩液50ml 1本	100ml/h	○					
05	点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌1180 10分かけて投与 ⑤ ☆トレアキシン点滴静注液(100mg/4mL) 90mg/m ² 生理食塩液50ml 1本 0.9V 90 mg/m ²	300ml/h	○					
06	点滴 点滴注射（速度指示） ルートフラッシュ用 ⑥ 生理食塩液50ml 1本	200ml/h	○					
続き有り								

確認コメント

注意コメント

【RIT(375mg/m² d1), Bendamustine(90mg/m² d1-2), q28】
 リツキサン投与速度初回：0分 25mL/h, 60分後 100mL/h, 120分後 200mL/h
 リツキサン投与速度2回目以降：0分 100mL/h, 60分後 200mL/h
 HBV感染有無確認

レジメン番号 12720

レジメンマスタシート

2 / 2

発行日時 2022年08月02日 16時47分

レジメンNo. 057083 診療科 血液・腫瘍内科
 レジメン名称 R-Bendamustine療法 (リツキサン同日投与)

有効期間 2011/05/02~2099/12/31
 適用日数 28日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)	day (2)				
07	点滴 点滴注射 (速度指示) ① ※CSTD7ダ'プ'タ 生理食塩液 50ml トレアキシン用ルートキ'フ' 1本	200ml/h		○				
08	点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 10分かけて投与 ② ☆トレアキシン点滴静注液 (100mg/4mL) 90mg/m ² 生理食塩液 50ml 1本 90 mg/m ² 0.9V	300ml/h		○				
09	点滴 点滴注射 (速度指示) ルートフラッシュ用 ③ 生理食塩液 50ml 1本	200ml/h		○				
終了								

確認コメント	
注意コメント 【RIT (375mg/m ² d1), Bendamustine (90mg/m ² d1-2), q28】 リツキサン投与速度初回 : 0分 25mL/h, 60分後 100mL/h, 120分後 200mL/h リツキサン投与速度2回目以降 : 0分 100mL/h, 60分後 200mL/h HBV感染有無確認	