

レジメンマスタシート

レジメンNo. 05708348 診療科 血液・腫瘍内科
 レジメン名称 G-B療法(G同日投与)2サイクル目以降

有効期間 2018/12/17~2099/12/31
 適用日数 28日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)	day(2)				
01	点滴 点滴注射(速度指示) 主管より ① ※GSTD7がフタ 生理食塩液50ml ソル・メドロール静注用(40mg)【AD】	200ml/h 1本 2V	10:00					
02	点滴 点滴注射(速度指示) 主管より ② アセリオ静注液(1000mg/100ml) ポララミン注(5mg/1ml)	400ml/h 1V 1A	10:15					
03	点滴 点滴注射(速度指示) 前投薬終了後、30分投与間隔を空けるため。 主管より ③ 大塚生食注(100ml)	200ml/h 1本	10:30					
04	点滴 点滴注射(抗悪性腫瘍剤+無菌180) TOTAL 500 mLに調製 主管より ④ インラインフィルター使用 ☆ガザイバ点滴静注(1000mg/40mL) テルモ生食注(500ml)	1000mg/Body 460ml 1V	11:00					
05	点滴 点滴注射 主管より ⑤ 生理食塩液50ml ガザイバフラッシュ用	1本	○					
----- 続き有り -----								

確認コメント
HBV感染有無確認

注意コメント
【Obinutuzumab(1000mg/body d1), Bendamustine(90mg/m2 d1-2), q28】
 がザイバ2サイクル以降投与速度(G3以上のIRない場合)：0分50mL/h, 30分後450mL/h
 G3以上のIRあった場合は初回投与時の速度で実施
 前回投与でIRない場合は、アセリオのみで可。G1-2の場合は、アセリオ+ポララミンのみで可。
 HBV感染有無確認

レジメンマスタシート

レジメンNo. 05708348 診療科 血液・腫瘍内科
 レジメン名称 G-B療法(G同日投与)2サイクル目以降

有効期間 2018/12/17~2099/12/31
 適用日数 28日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)	day(2)				
06	点滴 点滴注射(速度指示) ⑥ パノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイ村」 生理食塩液 50ml	100ml/h 1V 1本	○					
07	点滴 点滴注射(速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 10分かけて投与 ⑦ ☆トリアキシン点滴静注液(100mg/4mL) 生理食塩液 50ml 90 mg/m2	300ml/h 90mg/m ² 1本 0.9V	○					
08	点滴 点滴注射 全開で投与 ルートフラッシュ用 ⑧ 生理食塩液 50ml	1本	○					
09	点滴 点滴注射(速度指示) ① ※CSTD7タ'ブ'タ 生理食塩液 50ml トリアキシン用ルートキ'ブ'	200ml/h 1本		10:15				
10	点滴 点滴注射(速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 Day1トリアキシン投与終了後から12時間経過観察必要 ② ☆トリアキシン点滴静注液(100mg/4mL) 10分かけて投与 生理食塩液 50ml 90 mg/m2	300ml/h 90mg/m ² 1本 0.9V		10:30				
続き有り								

確認コメント
 HBV感染有無確認

注意コメント
 【Obinutuzumab(1000mg/body d1), Bendamustine(90mg/m2 d1-2), q28】
 がザイバ 2サイクル以降投与速度(G3以上のIRない場合): 0分50mL/h, 30分後450mL/h
 G3以上のIRあった場合は初回投与時の速度で実施
 前回投与でIRない場合は、アセリオのみで可。G1-2の場合は、アセリオ+ホ'ラミンのみで可。
 HBV感染有無確認

レジメンマスタシート

3 / 3

発行日時 2022年08月02日 16時47分

レジメンNo. 05708348 診療科 血液・腫瘍内科
 レジメン名称 G-B療法(G同日投与)2サイクル目以降

有効期間 2018/12/17~2099/12/31
 適用日数 28日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)	day(2)				
11	点滴 点滴注射 全開で投与 ルートフラッシュ用 ③ 生理食塩液 50ml	1本		10:45				
—— 終了 ——								

確認コメント
 HBV感染有無確認

注意コメント
 【Obinutuzumab(1000mg/body d1), Bendamustine(90mg/m2 d1-2), q28】
 ガザイバ 2サイクル以降投与速度(G3以上のIRない場合) : 0分50mL/h, 30分後450mL/h
 G3以上のIRあった場合は初回投与時の速度で実施
 前回投与でIRない場合は、アセリオのみで可。G1-2の場合は、アセリオ+ホラミンのみで可。
 HBV感染有無確認

レジメン番号 13625