

# レジメンマスタシート

1 / 1

発行日時 2022年08月02日 16時46分

レジメンNo. 570844 診療科 血液・腫瘍内科  
 レジメン名称 ガザイバ単剤 (他レジメン追加用)

有効期間 2018/10/17~2099/12/31  
 適用日数 1日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	速度指示	day(1)					
01	点滴 点滴注射 (速度指示) 主管より ① ※CSTD7ダプタ 生理食塩液 50ml ソル・メドロール静注用 (40mg) 【AD】	1本 2V	200ml/h	10:00					
02	点滴 点滴注射 (速度指示) 主管より ② アセリオ静注液 (1000mg / 100ml) ボララミン注 (5mg/1ml)	1V 1A	400ml/h	10:15					
03	点滴 点滴注射 (速度指示) 前投薬終了後、30分投与間隔を空けるため。 主管より ③ 大塚生食注 (100ml)	1本	200ml/h	10:30					
04	点滴 点滴注射 (抗悪性腫瘍剤+無菌180) TOTAL 500 mLに調製 主管より ④ インラインフィルター使用 ☆ガザイバ点滴静注 (1000mg/40mL) テルモ生食注 (500ml)	1000mg/Body 460ml	1V	11:00					
05	点滴 点滴注射 主管より ⑤ 生理食塩液 50ml ガザイバフラッシュ用	1本		○					
終了									

**確認コメント**

HBV感染有無確認

**注意コメント**

【Obinutuzumab (1000mg/body d1)】HBV感染有無確認  
 1サイクル初回投与速度：30分毎 25→50→75→100→125→150→175→200mL/h  
 1サイクル2回目以降投与速度：30分毎 50→100→150→200mL/h  
 2サイクル以降投与速度 (G3以上のIRなし)：0分50mL/h, 30分後450mL/h (IRあれば初回同様)  
 前回投与でIRない場合は、アセリオのみで可。G1-2の場合は、アセリオ+ボララミンのみで可。

レジメン番号 13610