

# レジメンマスタシート

1 / 2

発行日時 2022年08月02日 16時47分

レジメンNo. 057095 診療科 血液・腫瘍内科

有効期間 2021/05/17~2099/12/31

レジメン名称 Pola-BR療法 (2コース目以降)

適用日数 21日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	速度指示	day (1)	day (2)				
01	点滴 点滴注射 (速度指示) ① ※CSTD7タフタ ポララミン注(5mg/1ml) 1A パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイ村」 1V プレドニン水溶性注(50mg)【AD】 100mg 生理食塩液50ml 1本	100ml/h		09:30					
02	点滴 点滴注射 (速度指示) 前投薬フラッシュ用 ② 生理食塩液50ml 1本	100ml/h		10:00					
03	点滴 点滴注射 (抗悪性腫瘍剤+無菌1180) ③ ☆リツキサン注500mg/50ml 375mg/m <sup>2</sup> 0.75V テルモ生食注(500ml) 1袋 正式には1mg/mLの濃度に 375 mg/m <sup>2</sup>			10:30					
04	点滴 点滴注射 (速度指示) リツキサン終了後経過観察用 ④ 生理食塩液50ml 1本	100ml/h		○					
05	点滴 点滴注射 (抗悪性腫瘍剤+無菌1180) 初回90分投与、2回目以降30分に短縮可能 ⑤ インラインフィルター使用 ☆ポライビー点滴静注用30mg 1.8mg/kg 0.06V 大塚蒸留水(20ml) 1A 1Vあたり1.8mLで溶解 (20mg/mLの濃度) 大塚生食注(100ml) 1本 1.8 mg/kg			14:00					
----- 続き有り -----									

**確認コメント**

加ナール300mg 3T+レスタミン10mg 5T 処方

**注意コメント**

【RIT (375mg/m<sup>2</sup> d1), Polatuzumab (1.8mg/kg d1), Bendamustine (90mg/m<sup>2</sup> d1-2), q21】  
 リツキサン投与速度2回目以降：0分 100mL/h, 60分後 200mL/h  
 HBV感染有無確認  
 Polatuzumab投与の30~60分前に加ナール300mg 3T+レスタミン10mg 5T内服

レジメン番号 13798



# レジメンマスタシート

発行日時 2022年08月02日 16時47分

レジメンNo. 057095      診療科 血液・腫瘍内科  
 レジメン名称 Pola-BR療法 (2コース目以降)

有効期間 2021/05/17~2099/12/31  
 適用日数 21日      最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)		day (1)	day (2)					
		速度指示								
06	点滴      点滴注射 (速度指示) ポライビー投与後経過観察用  ⑥ 生理食塩液 50ml	100ml/h		14:30						
07	点滴      点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 10分かけて投与  ⑦ ☆トリアキシン点滴静注液 (100mg/4mL)      90mg/m <sup>2</sup> 0.9V 生理食塩液 50ml      1本 90 mg/m <sup>2</sup>	300ml/h		15:00						
08	点滴      点滴注射 (速度指示) ルートフラッシュ用  ⑧ 生理食塩液 50ml	200ml/h		15:15						
09	点滴      点滴注射 (速度指示)  ① ※CSTD7タプタ 生理食塩液 50ml トリアキシン用ルートキープ	200ml/h		09:45						
10	点滴      点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 10分かけて投与  ② ☆トリアキシン点滴静注液 (100mg/4mL)      90mg/m <sup>2</sup> 0.9V 生理食塩液 50ml      1本 90 mg/m <sup>2</sup>	300ml/h		10:00						
11	点滴      点滴注射 (速度指示) ルートフラッシュ用  ③ 生理食塩液 50ml	200ml/h		10:15						
終了										

**確認コメント**

加ナール300mg 3T+レスタミン10mg 5T 処方

**注意コメント**

【RIT (375mg/m<sup>2</sup> d1), Polatuzumab (1.8mg/kg d1), Bendamustine (90mg/m<sup>2</sup> d1-2), q21】  
 リツキシン投与速度2回目以降 : 0分 100mL/h, 60分後 200mL/h  
 HBV感染有無確認  
 Polatuzumab投与の30~60分前に加ナール300mg 3T+レスタミン10mg 5T内服

レジメン番号 13798