

レジメンマスタシート

1 / 3

発行日時 2022年08月02日 17時00分

レジメンNo. 055408 診療科 呼吸器内科

有効期間 2019/01/12~2099/12/31

レジメン名称 Pembrolizumab+CBDCA+nab-PTX

適用日数 21日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day (1)	day (8)	day (15)				
01	点滴 主管より ① ※CSTD7タフタ 大塚生食注(100ml) パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホ 」 デキスト注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg) 【AD	点滴注射(速度指示) 200ml/h	09:15						
02	点滴 主管より ② 生理食塩液50ml	点滴注射(速度指示) 200ml/h	09:45						
03	点滴 主管より ③ インラインフィルター使用 ☆キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL) 生理食塩液50ml	点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌1180 100ml/h 200mg/Body 1本	10:00						
04	点滴 主管より ④ 生理食塩液50ml	点滴注射(速度指示) 200ml/h	10:30						
05	点滴 77ラキソ ルートキフ用 側管より ① ※CSTD7タフタ 生理食塩液50ml	点滴注射(速度指示) 200ml/h	10:30						
続き有り									
確認コメント AUC=6 (MAX 900mg) イメント 処方確認									
注意コメント AUC=6 (MAX 900mg) 【Pembrolizumab(200mg/body d1), nab-PTX(100mg/m2 d1, 8, 15), CBDCA (AUC6 d1), q21] d1イメント 125mg d2-3イメント 80mg併用 キイトルーダ 最終濃度1~10mg/mLとなるよう希釈 ルート2本必要(フィルターあり用、フィルターなし用)									

レジメン番号 13641

レジメンマスタシート

2 / 3

発行日時 2022年08月02日 17時00分

レジメンNo. 055408 診療科 呼吸器内科
 レジメン名称 Pembrolizumab+CBDCA+nab-PTX

有効期間 2019/01/12~2099/12/31
 適用日数 21日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（主単位）	速度指示	day (1)	day (8)	day (15)				
06	点滴 点滴注射（抗悪性腫瘍剤＋無菌1180） 30 分かけて投与 空生食容器使用 側管より ② インラインフィルター不可 生理食塩液 50ml 100 mg/m ² （毒）アブラキサン点滴静注用（100mg） 懸濁液0.2ml/mgに調製	1本	100mg/m ²	1V	10:45					
07	点滴 点滴注射（速度指示） 77* ラキサン フラッシュ用 側管より ③ 生理食塩液 50ml	1本	200ml/h		11:15					
08	点滴 点滴注射（速度指示）抗悪性腫瘍剤＋無菌1180 主管より ⑤ 5%大塚糖液（250ml） AUC=6 CBDCA投与量 最大900mg （毒）カルボ プラチン点滴静注液 NK（150mg/15mL）	1本	250ml/h	0.0067 V	11:30					
09	点滴 点滴注射（速度指示） 主管より ⑥ 生理食塩液 50ml	1本	250ml/h		12:30					
続き有り										

確認コメント

AUC=6 (MAX 900mg) イメント 処方確認

注意コメント

AUC=6 (MAX 900mg)
 【Pembrolizumab (200mg/body d1), nab-PTX (100mg/m² d1, 8, 15), CBDCA (AUC6 d1), q21】
 d1イメント 125mg d2-3イメント 80mg併用
 キトルダ 最終濃度1~10mg/mLとなるよう希釈
 ルート2本必要（フィルターあり用、フィルターなし用）

レジメン番号 13641

レジメンマスタシート

3 / 3

発行日時 2022年08月02日 17時00分

レジメンNo. 055408 診療科 呼吸器内科

有効期間 2019/01/12~2099/12/31

レジメン名称 Pembrolizumab+CBDCA+nab-PTX

適用日数 21日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（主単位）	速度指示	day(1)	day(8)	day(15)				
10	点滴 点滴注射（速度指示） 主管より ① ※CSTD7タフタ デキスト注射液（6.6mg/2ml）（エステル8mg） 【AD】 グラニセトロン点滴静注 パック（3mg/50mL）「HKJ」	100ml/h			09:15	09:15				
11	点滴 点滴注射（速度指示） 主管より ② 生理食塩液50ml	200ml/h			09:45	09:45				
12	点滴 点滴注射（抗悪性腫瘍剤＋無菌1180） 30分かけて投与 空生食容器使用 主管より ③ インラインフィルター不可 生理食塩液50ml 100mg/m ² （毒）アブラキサン点滴静注用（100mg） 懸濁液0.2ml/mgに調製	100mg/m ²	1V		10:00	10:00				
13	点滴 点滴注射（速度指示） 主管より ④ 生理食塩液50ml	250ml/h			10:30	10:30				
終了										

確認コメント

AUC=6 (MAX 900mg) イメント 処方確認

注意コメント

AUC=6 (MAX 900mg)

【Pembrolizumab (200mg/body d1), nab-PTX (100mg/m² d1, 8, 15), CBDCA (AUC6 d1), q21】

d1イメント 125mg d2-3イメント 80mg併用

キイトルダ 最終濃度1~10mg/mLとなるよう希釈

ルート2本必要（フィルターあり用、フィルターなし用）

レジメン番号 13641