

レジメンマスタシート

1 / 2

発行日時 2020年11月26日 17時37分

レジメンNo. 007009 診療科 産科婦人科

有効期間 2013/06/28~2099/12/31

レジメン名称 PLD+CBDCA

適用日数 28日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位)	速度指示	day(1)					
01	点滴 点滴注射(速度指示) ※CSTD7*ア*ア* ① 15分で テキート注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg) 6.6mg 【AD グラニセトロン点滴静注 パック(3mg/50mL)「HK」 1袋	200ml/h		09:45					
02	点滴 点滴注射(速度指示) ② 30分で 5%大塚糖液(100ml) 1本	200ml/h		10:00					
03	点滴 点滴注射(速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌1180 250ml/h 投与中、手首足首クーリング ③ 輸液ポンプで 【禁】フィルター ☆ドキシル注(20mg/10ml) 30mg/m ² 1.5V 5%大塚糖液(250ml) 1本 ※血管外漏出に特に注意が必要 30 mg/m ²	250ml/h		10:30					
04	点滴 点滴注射(速度指示) ④ 15分で 5%ブドウ糖注(50mL) 1本	200ml/h		11:30					
----- 続き有り -----									

確認コメント

AUC5 iPLASのSCr<0.7はSCr=0.7として計算

注意コメント

【PLD(30mg/m²), CBDCA(AUC=5), q28】
 AUC=5 ドキシル投与中、手首足首をアイスパックにて冷却
 ナゼア、イメンド併用

レジメン番号 13152

レジメンマスタシート

発行日時 2020年11月26日 17時37分

レジメンNo. 007009 診療科 産科婦人科
 レジメン名称 PLD+CBDCA

有効期間 2013/06/28~2099/12/31
 適用日数 28日 最大回数 99回

RpNo.	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)					
05	点滴 点滴注射(速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 Cockcroft-Gaultで計算 60 分で ⑤ ☆(毒)カルボプチン点滴静注液 NK(450mg/45mL) 5%大塚糖液(250ml) AUC=5 CBDCA投与量 最大750mg。	280ml/h 1mg/GFR+25 0.0022 V 1本	11:45					
06	点滴 点滴注射 (速度指示) ルートフラッシュ用 15 分で ⑥ 生理食塩液 50ml	200ml/h 1本	12:45					
終了								

確認コメント AUC5 iPLASのSCr<0.7はSCr=0.7として計算	
注意コメント 【PLD(30mg/m ²), CBDCA(AUC=5), q28】 AUC=5 ドキシル投与中、手首足首をアイスパックにて冷却 ナゼア、イメンド併用	