

レジメンマスタシート

発行日時 2020年11月13日 18時07分

レジメンNo. 057012 診療科 血液・腫瘍内科
 レジメン名称 RCHOP

有効期間 2011/08/03~2099/12/31
 適用日数 21日 最大回数 10回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	速度指示	day (1)	day (2)				
01	点滴 点滴注射 (速度指示) ① ※CSTD7タ [®] ブ [®] タ 生理食塩液 50ml ポラミン注 (5mg/1ml) ソル・コーテフ注射用 (100mg) 【AD】	1本 1A 1V	100ml/h	10:00					
02	点滴 点滴注射 (抗悪性腫瘍剤+無菌1180) ② テルモ生食注 (500ml) ☆リツキサン注 500mg / 50mL 正式には1mg/mlの濃度に 375 mg/m ²	1袋 375mg/m ²	0.75 V	10:30					
03	点滴 点滴注射 (速度指示) ルートフラッシュ用 ③ 生理食塩液 50ml	1本	200ml/h	○					
04	点滴 点滴注射 (速度指示) ① ※CSTD7タ [®] ブ [®] タ プレドニン水溶性注 (50mg) 【AD】 グラニセトロン点滴静注 バッグ (3mg/50mL) 「HK」	100mg 1袋	100ml/h	10:00					
05	点滴 点滴注射 (抗悪性腫瘍剤+無菌1180) 全開で投与 ② 生理食塩液 50ml 1.4 mg/m ² ☆オンコビン注 (1mg)	1本 1.4mg/m ²	1.4 V	10:30					
----- 続き有り -----									

確認コメント

プレドニン経口 100mg (day3-6) オンコビン最大2mg

注意コメント

【RIT (375mg/m² d1), q21】 HBV感染有無確認
 【PSL (100mg/body d2-6), VCR (1.4mg/m² d2), ADM (50mg/m² d2), CPA (750mg/m² d2), q21】
 リツキサン投与速度初回: 0分 25mL/h, 60分後 100mL/h, 120分後 200mL/h
 リツキサン投与速度2回目以降: 0分 100mL/h, 60分後 200mL/h
 プレドニン経口 100mg/日 (day3-6) オンコビン 最大投与量 2mg 通常6~8コース施行

レジメン番号 12693

レジメンマスタシート

2 / 2

発行日時 2020年11月13日 18時07分

レジメンNo. 057012

診療科 血液・腫瘍内科

有効期間 2011/08/03~2099/12/31

レジメン名称 RCHOP

適用日数 21日 最大回数 10回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位)	速度指示	day(1)	day(2)				
06	点滴 点滴注射(抗悪性腫瘍剤+無菌180) 全開で投与 ③ ☆ドキルビシ塩酸塩注射液 「サト」(50mg/25mL) 大塚生食注(100ml) 50 mg/m2	50mg/m ²	1V		10:45				
07	点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 ④ ☆エンドキサン注(500mg) テルモ生食注(500ml) 750 mg/m2	750mg/m ²	1.5V		11:00				
08	点滴 点滴注射(速度指示) ルートフラッシュ用 ⑤ 生理食塩液50ml		200ml/h		13:00				
終了									

確認コメント

プレドニン経口 100mg (day3-6) オンコピン最大2mg

注意コメント

【RIT(375mg/m² d1), q21】 HBV感染有無確認
 【PSL(100mg/body d2-6), VCR(1.4mg/m² d2), ADM(50mg/m² d2), CPA(750mg/m² d2), q21】
 リツキチン投与速度初回: 0分 25mL/h, 60分後 100mL/h, 120分後 200mL/h
 リツキチン投与速度2回目以降: 0分 100mL/h, 60分後 200mL/h
 プレドニン経口 100mg/日 (day3-6) オンコピン 最大投与量 2mg 通常6~8コース施行

レジメン番号 12693