

レジメンマスタシート

発行日時 2020年11月13日 18時10分

レジメンNo. 057027 診療科 血液・腫瘍内科

有効期間 2011/08/16~2099/12/31

レジメン名称 R-THPCOP(岐阜大プロトコール 70-79歳)

適用日数 21日 最大回数 25回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位)	速度指示	day(1)	day(2)				
01	点滴 点滴注射(速度指示) ① ※CSTD7タ*プタ ボラミン注(5mg/1ml) ソル・コーテフ注射用(100mg)【AD】 生理食塩液50ml	1A 1V 1本	100ml/h	10:00					
02	点滴 点滴注射(抗悪性腫瘍剤+無菌1180) ② ☆リツキサン注500mg/50mL テルモ生食注(500ml) 正式には1mg/mLの濃度に 375 mg/m2	375mg/m ² 1袋	0.75V	10:30					
03	点滴 点滴注射(速度指示) ルートフラッシュ用 ③ 生理食塩液50ml	1本	200ml/h	○					
04	点滴 点滴注射(速度指示) ① ※CSTD7タ*プタ プレドニン水溶性注(20mg)【AD】 グラニセトロン点滴静注 バッグ(3mg/50mL)「HK」	40mg/m ² 1袋	100ml/h		10:00				
05	点滴 点滴注射(抗悪性腫瘍剤+無菌1180) 全開で投与 ② ☆オンコピン注(1mg) 生理食塩液50ml 1.4 mg/m2	1.4mg/m ² 1本			10:30				
----- 続き有り -----									

確認コメント

プレドニン経口 40mg/m2 (day3-6)

注意コメント

【RIT(375mg/m2 d1), q21】 HBV感染有無確認
 【PSL(40mg/m2 d2-6), VCR(1.4mg/m2 d2), THP(40mg/m2 d2), CPA(650mg/m2 d2), q21】
 リツキサン投与速度初回 : 0分 25mL/h, 60分後 100mL/h, 120分後 200mL/h
 リツキサン投与速度2回目以降 : 0分 100mL/h, 60分後 200mL/h
 プレドニン経口 40mg/m2 (day3-6) オンコピン最大投与量2mg 通常6~8コース施行

レジメン番号 12849

レジメンマスタシート

2 / 2

発行日時 2020年11月13日 18時10分

レジメンNo. 057027 診療科 血液・腫瘍内科

有効期間 2011/08/16~2099/12/31

レジメン名称 R-THPCOP(岐阜大プロトコール 70-79歳)

適用日数 21日 最大回数 25回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)	day (2)				
06	点滴 全開で投与 ③ ☆ピノルビン注(20mg) 5%ブドウ糖注(50mL) 40 mg/m ²	点滴注射(抗悪性腫瘍剤+無菌180) 40mg/m ² 1本 2V		10:45				
07	点滴 ④ ☆エンドキサン注(500mg) テルモ生食注(500ml) 650 mg/m ²	点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 250ml/h 650mg/m ² 1袋 1.3V		11:00				
08	点滴 ⑤ 生理食塩液50ml	点滴注射(速度指示) ルートフラッシュ用 200ml/h 1本		13:00				
終了								

<p>確認コメント プレドニン経口 40mg/m² (day3-6)</p>	
<p>注意コメント 【RIT(375mg/m² d1), q21】 HBV感染有無確認 【PSL(40mg/m² d2-6), VCR(1.4mg/m² d2), THP(40mg/m² d2), CPA(650mg/m² d2), q21】 リツキチン投与速度初回：0分 25mL/h, 60分後 100mL/h, 120分後 200mL/h リツキチン投与速度2回目以降：0分 100mL/h, 60分後 200mL/h プレドニン経口 40mg/m² (day3-6) オンコビン最大投与量2mg 通常6~8コース施行</p>	

レジメン番号 12849