

# レジメンマスタシート

1 / 3

発行日時 2021年07月19日 09時17分

レジメンNo. 007132 診療科 産科婦人科

有効期間 2016/06/14~2099/12/31

レジメン名称 PLD(40mg/m<sup>2</sup>, d1)+BEV(10mg/kg, d1, 15) (継続)

適用日数 28日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位)		day(1)	day(15)					
		速度指示								
01	点滴 ① 30分で ※CSTD7袋 テキサト注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg) 【AD】 グラニセトロン点滴静注 バッグ(3mg/50mL)「HK」	点滴注射(速度指示)	100ml/h	09:30						
02	点滴 ② 15分で 5%ブドウ糖注(50mL)	点滴注射(速度指示)	200ml/h	10:00						
03	点滴 ③ 輸液ポンプで 【禁】フィルター ☆ドキシル注(20mg/10ml) 5%大塚糖液(250ml) ※血管外漏出に特に注意が必要 40 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 投与中、手首足首クーリング	166ml/h	10:15						
04	点滴 ④ 15分で 5%ブドウ糖注(50mL)	点滴注射(速度指示)	200ml/h	11:45						
----- 続き有り -----										

確認コメント

注意コメント

【PLD(40mg/m<sup>2</sup> d1), B-mab(10mg/kg d1, 15), q28】  
ドキシル投与中、手首足首をアイスパックにて冷却  
アバステン点滴速度 初回66ml/h 2回目100ml/h 3回目200ml/h

レジメン番号 13425

# レジメンマスタシート

発行日時 2021年07月19日 09時17分

レジメンNo. 007132 診療科 産科婦人科

有効期間 2016/06/14~2099/12/31

レジメン名称 **PLD(40mg/m2, d1)+BEV(10mg/kg, d1, 15) (継続)**

適用日数 28日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)	day (15)				
05	点滴 点滴注射 (速度指示) ルートフラッシュ用  15 分で ⑤ 生理食塩液 50ml	200ml/h    1本	12:00					
06	点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 30 分で ⑥ ☆アバチン点滴静注用(400mg/16ml) 大塚生食注(100ml) 10 mg/kg	200ml/h  10mg/kg 0.025V 1本	12:15					
07	点滴 点滴注射 (速度指示) アバチン投与後ルートフラッシュ用  15 分で ⑦ 生理食塩液 50ml	200ml/h    1本	12:45					
08	点滴 点滴注射 (速度指示) ① 15 分で ※CSTDがプタ 生理食塩液 50ml	200ml/h    1本		10:15				
09	点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 ② 30 分で ☆アバチン点滴静注用(400mg/16ml) 大塚生食注(100ml) 10 mg/kg	200ml/h  10mg/kg 0.025V 1本		10:30				
----- 続き有り -----								

確認コメント

注意コメント

【PLD(40mg/m2 d1), B-mab(10mg/kg d1, 15), q28】  
ドキシル投与中、手首足首をアイスパックにて冷却  
アバチン点滴速度 初回66ml/h 2回目100ml/h 3回目200ml/h

レジメン番号 13425

# レジメンマスタシート

3 / 3

発行日時 2021年07月19日 09時17分

レジメンNo. 007132 診療科 産科婦人科

有効期間 2016/06/14~2099/12/31

レジメン名称 PLD(40mg/m<sup>2</sup>, d1)+BEV(10mg/kg, d1, 15) (継続)

適用日数 28日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)	day (15)				
10	点滴 点滴注射 (速度指示) アバスチン投与後ルートフラッシュ用  ③ 15 分で 生理食塩液 50ml	200ml/h   1本		11:00				
----- 終了 -----								

確認コメント

注意コメント

【PLD(40mg/m<sup>2</sup> d1), B-mab(10mg/kg d1, 15), q28】  
ドキシル投与中、手首足首をアイスパックにて冷却  
アバスチン点滴速度 初回66ml/h 2回目100ml/h 3回目200ml/h

レジメン番号 13425