

レジメンマスタシート

発行日時 2021年07月19日 09時19分

レジメンNo. 062610 診療科 乳腺・内分泌外科 有効期間 2019/12/04~2099/12/31
 レジメン名称 **Abraxane (d1, 8, 15) +Atezolizumab (d1, 15)** 適用日数 28日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)	day (8)	day (15)				
01	点滴 点滴注射 (速度指示) 主管より ① ※CSTD7タプタ デキート注射液 (6.6 mg/2ml) (エステル8 mg) 6.6mg 【AD グラニセトロン点滴静注 パツク (3mg/50mL) 「HK」 1袋	100ml/h	10:00		10:00				
02	点滴 点滴注射 (速度指示) 主管より ② 生理食塩液 50ml 1本	200ml/h	10:30		10:30				
03	点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 投与時間初回60分 2回目以降30分に短縮可 主管より ③ インフイルター使用 ☆テセントリク点滴静注 (840mg/14mL) 840mg/Body 1V 大塚生食注 (250ml) 1本 840 mg/body	250ml/h	10:45		10:45				
04	点滴 点滴注射 (速度指示) 主管より ④ 生理食塩液 50ml 1本	200ml/h	11:45		11:45				
----- 続き有り -----									

確認コメント

注意コメント

【Atezolizumab (840mg/body d1, 15), nab-PTX (100mg/m2 d1, 8, 15), q28】
 ルート2本必要 (フィルターあり用、フィルターなし用)
 テセントリク投与時間 初回60分 2回目以降30分に短縮可

レジメンマスタシート

2 / 3

発行日時 2021年07月19日 09時19分

レジメンNo. 062610 診療科 乳腺・内分泌外科
 レジメン名称 Abraxane (d1, 8, 15) +Atezolizumab (d1, 15)

有効期間 2019/12/04~2099/12/31
 適用日数 28日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)	day (8)	day (15)				
05	点滴 点滴注射 (速度指示) アブラキサンのルートキープ用 側管より ① ※CSTDアダプタ 生理食塩液 50ml 1本	200ml/h	11:45		11:45				
06	点滴 点滴注射 (抗悪性腫瘍剤+無菌180) 30分かけて投与 空生食容器使用 側管より ② インラインフィルタ-不可 生理食塩液 50ml 100 mg/m2 ☆ (毒) アブラキサンの点滴静注用 (100mg) 懸濁液0.2ml/mgに調製 100mg/m2 1V		12:00		12:00				
07	点滴 点滴注射 (速度指示) アブラキサンのフラッシュ用 側管より ③ 生理食塩液 50ml 1本	200ml/h	12:30		12:30				
08	点滴 点滴注射 (速度指示) 主管より ① ※CSTDアダプタ テセントリク注射液 (6.6mg/2ml) (エスル8mg) 【AD】 グラニセトロン点滴静注 バッグ (3mg/50mL) THK 6.6mg 1袋	100ml/h		10:00					
----- 続き有り -----									

確認コメント

注意コメント

【Atezolizumab (840mg/body d1, 15), nab-PTX (100mg/m2 d1, 8, 15), q28】
 ルート2本必要 (フィルターあり用、フィルターなし用)
 テセントリク投与時間 初回60分 2回目以降30分に短縮可

レジメン番号 13676

レジメンマスタシート

発行日時 2021年07月19日 09時19分

レジメンNo. 062610 診療科 乳腺・内分泌外科
 レジメン名称 **Abraxane (d1, 8, 15) +Atezolizumab (d1, 15)**

有効期間 2019/12/04~2099/12/31
 適用日数 28日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)				
			速度指示	day (1)	day (8)	day (15)
09	点滴 主管より ② 生理食塩液 50ml	点滴注射 (速度指示) 200ml/h		10:30		
10	点滴 30分かけて投与 空生食容器使用 主管より ③ インフィルタ-不可 生理食塩液 50ml 100 mg/m ² ☆ (毒) アブラキサン点滴静注用 (100mg) 懸濁液0.2ml/mgに調製	点滴注射 (抗悪性腫瘍剤+無菌180) 100mg/m ²	1V	10:45		
11	点滴 主管より ④ 生理食塩液 50ml	点滴注射 (速度指示) 200ml/h		11:15		
終了						

確認コメント

注意コメント

【Atezolizumab (840mg/body d1, 15), nab-PTX (100mg/m² d1, 8, 15), q28】
 ルート2本必要 (フィルターあり用、フィルターなし用)
 セントリク投与時間 初回60分 2回目以降30分に短縮可

レジメン番号 13676