

レジメンマスタシート

発行日時 2021年10月18日 08時03分

レジメンNo. 057220 診療科 血液・腫瘍内科

有効期間 2017/03/24~2099/12/31

レジメン名称 E-Ld(導入)(1, 2サイクル目)

適用日数 28日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)	day(8)	day(15)	day(22)			
01	点滴 点滴注射(速度指示) ① ※GSTDA7がブタ テキサト注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg) 6.6mg 【AD ポラミン注(5mg/1ml) 1A ガスター注(20mg/2ml) 1A 生理食塩液50ml 1本 エムプリシティ投与45分前に投与終了	200ml/h	10:00	10:00	10:00	10:00			
02	点滴 点滴注射(速度指示) 経過観察時投与用 ② 大塚生食注(100ml) 1本	133ml/h	10:15	10:15	10:15	10:15			
03	点滴 点滴注射(抗悪性腫瘍剤+無菌1180) ③ インラインフィルター使用 ☆エムプリシティ点滴静注用(400mg) 10mg/kg 0.025V 注射用水PL「フソー」(100ml) 1V 大塚生食注(250ml) 1本 10 mg/kg		11:00	11:00	11:00	11:00			
04	点滴 点滴注射(速度指示) フラッシュ用 ④ 生理食塩液50ml 1本	100ml/h	○	○	○	○			
終了									

確認コメント テキサス、カナル、レブラミド内服処方確認	
注意コメント 【Elo(10mg/kg, d1, 8, 15, 22), LEN(25mg/body, d1-21), DEX(8+28mg/body, d1, 8, 15, 22), q28] レブラミド内服 25mg/body, d1-21 テキサス内服 28mg/body, d1, 8, 15, 22 エムプリシティ投与速度 1サイクル目day1: 0分 30mL/h, 30分後 60mL/h, 60分後 120mL/h 1サイクル目day8: 0分 180mL/h, 30分後 240mL/h, day15, 22: 300mL/h, 2サイクル目以降: 300mL/h 前投薬としてテキサス錠4mg 7錠を3-24時間前に投与 投与前にカナル錠300mg 2錠内服	